

로에굿정

LE.JI-001

[원료약품 및 그 분량] 1정 중,

■ 유효성분

- 수산화마그네슘(KP) 500mg
- 우르소데옥시콜산(KP) 10mg
- 노회엑스(EP) 100mg

(히드록시안트라센유도체(바바로인)으로서 20mg)

■ 첨가제: 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 탭실드흰색(21W002), 포비돈

[성상]

흰색의 장방형 필름코팅정제

[효능·효과]

• 변비

• 변비에 따른 다음 증상의 완화: 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량]

만 15세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 3회 식전(식간 또는 식후)에 복용한다.

만 11세 이상 ~ 만 15세 미만: 1회 1정, 1일 2회 식전(식간 또는 식후)에 복용한다.

복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
- 2) 장폐색(창자막힘) 환자
- 3) 만 7세 이하의 어린이

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 심한 복통(배아픔) 또는 구역, 구토 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 신장장애 환자
- 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 5) 직장인 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
- 2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
- 3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- 3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다.
만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[포장단위] 300정/병

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30°C)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(http://www.dkpharm.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실(☎080-777-5678: 수신자 요금 부담)로 문의하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

■ 제조의뢰자: **동국제약(주)** 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19

■ 제조자: **에이프론텐제약(주)** 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

설명서 최종 개정 연월일: 2021. 11. 10