

한풍황련해독탕정

(단미엑스혼합제)

【원료약품 및 그 분량】 1회(2정) 중

■ 유효성분 :

황련연조엑스(4.8~5.8→1)(별규)	0.30g(황련으로서 1.56g)
황금연조엑스(1.9~2.4→1)(별규)	0.73g(황금으로서 1.56g)
황백연조엑스(2.9~3.6→1)(별규)	0.48g(황백으로서 1.56g)
치자연조엑스(2.5~3.0→1)(별규)	0.58g(치자로서 1.56g)

■ 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 라우릴황산나트륨, 스테아르산마그네슘, 크로스카멜로오스나트륨, 탭실드클리어(59C312), 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 갈색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】 한방건강보충용

【용법·용량】 한방건강보충용

【포장 단위】 300포/상자(2정/포X300포)

【저장 방법】 기밀용기, 실온보관(1~30°C)

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 신생아 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 수유부

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
2) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
3) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.
4) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.))

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 간질성폐렴 : 드물게 발열, 기침, 호흡곤란, 폐음이상(염발음, 捻髮音) 등이 나타난 경우에는 이 약의 복용을 중지하고, 신속하게 흉부X선 등의 검사를 실시하여 동시에 부신(콩팥위생)피질호르몬제 투여 등의 적절한 처치를 받을 것.
(2) 간기능장애 : 드물게 AST, ALT, ALP, γ-GTP의 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우
(3) 과민반응 : 발진, 두드러기 등
(4) 소화기계 : 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 구역, 구토, 복통(배아픔), 설사 등
2) 1개월(코피, 숙취에 복용하는 경우에는 5~6회) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
3) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것).
2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【제조판매원】 (유)한풍제약/전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1~3층, 5층. 봉동로 705

※ 본 의약품은 "우수 의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 첨부문서 작성일자(2020년 11월 09일) 이후에 변경된 내용은 소비자 상담실번호(02-521-2618)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 본 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.