

올펜트리플액션

두통·생리통·치통·오한·해열

연질캡슐

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1캡슐(720mg) 중

■ 유효성분 : 아세트아미노펜(KP)	150.00mg
에텐자미드(JP)	100.00mg
카페인무수물(KP)	24.90mg

■ 기타 첨가제 : 폴리에틸렌글리콜400, 프로필렌글리콜, 폴리에틸렌글리콜4000, 젤라틴, 소르비톨스페셜글리세린 블랜드, 정제수, 락트산, 산화티탄

【성 상】 흰색의 내용물을 함유한 적색의 타원형 연질캡슐

【용법용량】

- 만 15세 이상 및 성인 : 1일 1~3회, 1회 1~2캡슐
- 만 7세 초과 ~ 만 15세 미만 : 1일 1~3회, 1회 1캡슐
- 공복(빈 속)을 피하여 복용한다.
- 복용간격은 4시간 이상으로 한다.(1일 3회 복용 시)
- 복용간격은 6시간 이상으로 한다.(1일 2회 복용 시)

【효능효과】

1. 두통, 치통, 발치(이물 뽑음)후 동통(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요(허리)통, 근육통, 건통(어깨결림), 타박통, 골절통, 염좌통(뱀통증), 월경통(생리통), 외상(상처)통의 진통
2. 오한(춥고 떨리는 증상), 발열시의 해열

【사용상의 주의사항】

1. 경고
 - 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
 - 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름 물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
 - 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기와 복용시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
 - 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 해열진통제, 감기약, 진정제
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.
 - 1) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
 - 2) 만 3개월 이상 만 1세 미만의 영아(갓난아기)는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 바람직하다.
 - 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 6) 고령자(노인)
 - 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
 - 9) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
 - 10) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이노제를 복용하는 사람
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부불쾌감, 어지러움, 난청(귀먹음), 부종(부기), 이명(귀울림)
 - 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 증상(심한 증상) 증상이 나타난 경우
 - ① 속이나 팔꿈치(과민성소크) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - ② 피부점막만증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.
 - ③ 천식
 - ④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 됨) 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
 - 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
 - 4) 복용시에는 음주하지 말 것.
 - 5) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 10캡슐(10캡슐/PTP*1)

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 24 개월

【소비자상담실】 02-2002-9715

【판매원】 (주)유한메디카(서울특별시 동작구 노량진로 74)

【제조원】 (주)알파바이오(경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7)

- * 자세한 의약품 정보는 에니드릭(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- * 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)
- * 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오
- * 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질, 변태, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오

설명서 작성일자 : 2019.09.17

* 위 일자는 설명서 작성일자로 사용기한과 관련이 없습니다

[판매원]

Ym 유한메디카

[제조원]

Rp Bio 알피 바이오

서울특별시 동작구 노량진로 74

경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7