

일반의약품

분류번호 : 03190



항산화제를 함유한
고함량 기능성 활성비타민

벤포빅^정

【원료약품 및 그 분량】1정 중

* 유효성분

벤포비타민(KP)(티아민염산염으로서 72.3mg)	100mg
리보플라빈(KP)	100mg
니코틴아미드(KP)	100mg
판토텐산칼슘(KP)(칼슘으로서 8.4mg)	100mg
비타민B12염산염(KP)	100mg
비타민E(USP)	100μg
콜린(KP)	100μg
시아노코발린(1000배산(KP)(시아노코발린으로서 100μg)	100mg
이노시톨(KP)	100mg
클린타르타르산염(USP)	100mg
제피아스코르브신염류(아스코르브신으로서 101mg)	104.2mg
토코페롤아세테이트2배산(KP)(비타민D로서 40U)	80mg
신화아민(KP)(아민으로서 25mg)	31.2mg
신화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 18.1mg)	30mg
클레칼시페롤과립(별규)비타민D로서 1000IU)	10mg
γ-오리자놀(KP)	10mg
유비테카렌(KP)	10mg
우루소다익시를산(KP)	10mg
셀레늄함유간조효소(KP)(셀레늄으로서 4.88μg)	9.23mg

* 첨가제 : 감질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스타이아르산디메틸, 옥타디에틸렌글리콜(200F500003),

전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【효능·효과】

1. 다음증상의 비타민 D, E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후 - 발육기 - 노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과
는 다음과 같다. - 뼈, 이의 발육발달 - 구루병의 예방 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통
(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염, 각기
- 눈의피로

2. 아연의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 경우는 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalcemia) : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태때문. 유육종증(sarcoidosis) :
원인을 알 수 없는 전신 염증질환. 신장질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는
환자 (3) 만 12개월 미만의 젖먹이 (4) 신장결석 환자 (5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 약을 복용하지 말 것.

- (1) 인산염, 칼슘염, 장구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 만 1세 미만의 영아 (2) 의사의 처방을 받고 있는 환자 (3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는
어린이비타민 D 또는 칼슘 함유제제 (4) 고칼슘산노증 환자(hypercalcaemia : 오줌에 과량의 수산염이
배설되는 상태) (5) 입부 및 입안하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (6) 비타민 D는
모유로 분비되어 산모에게서 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다 (6) 소화장애, 만성궤양성대장염,
국한성대장염 등의 위장질환 환자 (7) 심장 순환기계기능 장애 환자 (8) 신장장애 환자 (9) 저단백혈
증 환자 (10) 감성약제를 투여 중인 환자 (11) 통풍 환자 또는 신장결석이 있는 환자 (12) 신장결석 병력이
있는 환자 (13) 입부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한
이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 위부(상복부)불쾌감, 변비, 발진,
발적(출혈이 없어짐), 붉은 변, 저혈압, 얼굴얼마오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점,
부전수축심장박동정지, 중추신경계 기능저하, 피부부기, 함·호흡시 악취, 발모, 조급증, 위장관장애,
소화장애, 상복부통증, 피부부기 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 많이 점점 많아질
수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. (3) 예스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는
혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. (4) 장기간
고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. (5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간
복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애) 또는 병적변화(이
나타날 수 있다. (6) 콜린이 부족한 환자에게 비타민 B₆를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적
이상반응이 나타날 수 있다. (7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 동맥성(포도당)내성
손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애, 고요산혈증(hyperursemia,
혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있다. (8) 대량투여로 인해 구역, 구토
등의 위장장애, 고나트륨혈증, 골혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (9) 장기투여에 의해
고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. (10) 할랄도스테로이드, 테트라히드레놀과 병용투여시 고칼슘혈증을
일으킬 수 있으므로 주의할 것. (11) 우발적으로 과량복용 한 경우 (12) 1개월 정도 복용하여도 증상의
개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 장해진 음식·음료를 잘 지킬 것. (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할
것. (3) 각종 요검시시에 해당의 검사를 방해할 수 있다. (4) 오를 함색으로 변하게 하여 임상검사치에
영향을 줄 수 있다. (5) 녹차, 홍차 등 단단을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한
곳에 (화재)에 보관할 것. (3) 오염(질소) 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【성상】 적색의 타원형 필름코팅정

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【포장방법】 60정/병, *20정/상자(60정/병×2)

【소비자상단일】 080-024-0030

【제조원】 (유)한포ong / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단6로 301 1~3층, 5층, 봉동로 705

【판매처】 한포ong(주) / 경기도 평택시 신안로 114

본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변태
또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다.

의약품을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어와 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관
하시기 바랍니다.

의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

자세한 사항은 의약품안전나라(<https://madr.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

부작용 피해구제 신청 : 한국약물안전진단원(1644-6223)

첨부문서 작성일 : 2019년 12월 10일