

치질 증상 처음부터 강력하게

디오맥스^정

600밀리그램 (디오스민)



최종 개정 연월일 : 2023.09.19

[제품명]

디오맥스정600밀리그램(디오스민)

[원료약품 및 그 분량]

1정(780mg) 중

- 유효성분 : 디오스민(EP) 600mg
- 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이EZ클리어(253U1 90007), 오파드라이분홍색(03B640092), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스

[성상]

분홍 또는 연분홍의 장방형 필름코팅정제

[효능효과]

- 치질과 관련된 징후의 치료
- 정맥부전과 관련된 증상의 개선 : 다리 중압감, 통증
- 모세혈관 취약증에 의한 장애의 보조치료

[용법·용량]

- 치질 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 2~3회(1,200~1,800mg) 식사 시 복용한다.
- 정맥부전 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 1회 식사 시 복용한다.

[사용상의 주의사항]**1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것**

- 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 수유부

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것

이 약 투여 후 호소증상이 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다.

이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다.

증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법]

밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위]

30정/병, 60정/상자(30정/병*2)

※ 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 자사 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화]

080-920-2002(고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제 신청]

1644-6223(한국의약품안전관리원), 14-3330(피해구제신청 전용번호)

[판매자]**동아제약** 서울특별시 동대문구 천호대로 64**[제조사]****풍림무약주식회사** 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120