J4488088/01A

전문의약품

트루셋®정 40/5/12.5mg, 80/5/12.5mg, 80/5/25mg

(텔미사르탄/암로디핀베실산염/클로르탈리돈)

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분

트루셋정40/5/12.5mg : 텔미사르탄(EP) 40mg, 암로디핀베실산염(EP) 6.935mg (암로디핀으로서 5mg), 클로르탈리돈(별규) 12.5mg

트루셋정80/5/12.5mg : 텔미사르탄(EP) 80mg, 암로디핀베실산염(EP) 6.935mg (암로디핀으로서 5mg), 클로르탈리돈(별규) 12.5mg

트루셋정80/5/25mg : 텔미사르탄(EP) 80mg, 암로디핀베실산염(EP) 6.935mg (암로디핀으로서 5mg), 클로르탈리돈(별규) 25mg

[성상] 트루셋정40/5/12.5mg, 80/5/12.5mg, 80/5/25mg : 흰색의 타원형 삼층정

	40/5/12.5mg	80/5/12.5mg	80/5/25mg
앞면	TS1	TS2	TS3
뒷면	YH	YH	YH

[효능 · 효과]

텔미사르탄과 암로디핀의 복합요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압

[용법 · 용량]

이 약은 1일 1회 1정을 식사와 관계없이 물과 함께 복용한다. 가능하면 매일 같은 시간에 아침에 복용하는 것이 권장된다.

이 약을 투여하기 전에 개개의 성분(텔미사르탄과 암로디핀)의 단독요법 또는 복합요법으로 용량을 조절할 것이 권장된다.

텔미사르탄/암로디핀의 복합요법으로 혈압이 조절되지 않는 환자에게 이 약 40/5/12.5밀리그램을 투여할 수 있으며, 환자의 혈압 반응을 고려하여 2주 이상의 간격을 두고 용량을 조절한다. 이 약의 최대 투여용량은 80/5/25밀리그램이다.

텔미사르탄/암로디핀 복합제와 클로르탈리돈 단일제를 병용하고 있는 환자의 경우, 복용 편의성을 위하여 이 약 세 개의 각 성분 함량이 동일한 복합제로 전환할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

...

4. 소아에 대한 투여

이 약은 만 18세 미만 소아환자에서의 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로, 투여가 권장되지 않는다.

9. 고령자에 대한 투여

75세 이상의 고령자인 경우, 암로디핀의 청소율이 감소되어 있으므로, 낮은 용량으로 치료를 시작하며, 용량을 서서히 증량한다.

※ 이 첨부문서의 작성연월일 이후 변경내용은 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일 2019. 8. 27

제조판매자
유한양행
본사 : 서울특별시 동작구 노량진로 74
공장 : 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219
홈페이지 : www.yuhan.co.kr
소비자상담실 : 080-024-1188
(수신자 요금부담)

J4488088/01B