

전 문 의 약 품
분류번호:122

손페리 서방정

(에페리손염산염)

원료약품 및 그 분량 : 1정 중

- 유효성분 : 에페리손염산염(KP) 75.0mg
- 첨가제(기타) : 미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 시트르산수화물, 오파드라이한색(88A180040), 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성아산화규소, 히프록셀로오스

성 상 : 흰색 내지 거의 흰색의 원형 서방정 필름코팅정

효능·효과

근골격계질환에 수반하는 통통성 근육육: 경견완추근, 견관절주위염, 요통

용법·용량

이 약은 서방정 정제이므로 분쇄하거나 분할 또는 씹지 않고 전체를 복용한다.

성인 : 1일 2회, 1회 1정(에페리손염산염으로서 75mg) 식후 경구 투여한다.

어린이, 증상상에 따라 적절한 투여량이다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 중증의 근무력증 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 간장애 환자(간기능을 악화시킬 수 있다)

3. 이상반응

3.1 에페리손염산염 일반정에서 보고된 이상반응

- 1) 속 및 아나필락시양 반응 : 드물게 속 및 아나필락시양 반응을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상(예 : 발적, 가려움, 두드러기, 부종, 호흡곤란 등) 이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 2) 중증성표피괴사증후군 및 피부점막인증후군(스티븐스-존슨 증후군) : 에페리손염산염은 중증성표피괴사증후군 및 피부점막인증후군 등 심각한 피부 이상을 유발할 수 있기 때문에, 발열, 홍반, 물집, 가려움, 안구 충혈, 구내염 등의 증상이 나타나지는지 잘 관찰하여야 하고, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 3) 다른 이상반응

	때때로(0.1~5%미만)	드물게(0.1%미만)	빈도불명
간장 ¹⁾		ALT, AST, ALP 상승	
신장 ¹⁾		단백뇨, BUN의 상승	
혈액 ¹⁾		빈혈	
과민증 ²⁾	발진	가려움	다형성출진 홍반
정신신경계	불면, 졸음, 두통, 사지마비	몸의 굳어짐, 사지떨림	
소화기계	구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통	복부팽만감, 구내염	
비뇨기계		요배, 요실금, 잔뇨감	
전신증상	무력감, 비틀거림, 전신권대감	어지러움, 근긴장저하	
기타	안면홍조	발한, 부종, 가슴두근거림	말골질

¹⁾ 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.

²⁾ 이러한 증상이 나타나는 경우 투여를 중지한다.

3.2 에페리손염산염 서방정의 이상반응

- 1) 금식 요통을 동반한 근골격계 근육육증 증상이 있는 환자를 대상으로 한 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조, 평행군 임상시험(n=238)에서, 총 12명에서 이상반응이 발생하였고, 발현율은 시험군(서방정)에서 5.26% (6/114명, 6건), 대조군(일반정)은 4.84% (6/124명, 6건)로 조사되었다. 시험군과 대조군 모두에서 중대한 이상반응은 보고되지 않았다. 임상약과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상작용을 발현율을 분석한 결과, 시험군은 1.75% (2/114명, 2건), 대조군은 0.81% (1/124명, 1건)로 조사되었다. 2% 이상의 발현빈도를 나타낸 이상반응은 어지러움(2.63%) 뿐이었다.

임상시험 중 이 약 투여군 및 대조군에서 보고된 이상반응을 발현기관별로 나열하면 다음과 같다.

<이상반응 종류별 발현 현황>

	시험군(n=114) 에페리손염산염 서방정		대조군(n=124) 에페리손염산염 일반정	
	발현율	발현건수	발현율	발현건수
	n	(%)	n	(%)
신경계 장애	3	(2.63)	2	(1.61)
어지러움	3	(2.63)	0	(0.00)
두통	0	(0.00)	1	(0.81)
졸음	0	(0.00)	1	(0.81)
소화기계	2	(1.75)	1	(0.81)
소화불량	1	(0.88)	1	(0.81)
설사	1	(0.88)	0	(0.00)
감염 및 침입	0	(0.00)	2	(1.61)
비인두염	0	(0.00)	1	(0.81)
상기도 감염	0	(0.00)	1	(0.81)
일반장염 및 투여부위 상태	1	(0.88)	0	(0.00)
국소부종	1	(0.88)	0	(0.00)
손상, 종독, 절차상합병증	0	(0.00)	1	(0.81)
인대 염좌	0	(0.00)	1	(0.81)

2) 국내 시판 후 조사결과

국내에서 재심사를 위하여 4년 동안 3,247명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 8.59%(279/3,247명, 총 412건)로 보고되었다. 이 중 인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 및 인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응은 발현 빈도에 따라 아래 표에 나열하였다.

발현 빈도	기관계	인과관계와 상관없는 중대한 이상사례 0.09%(3/3,247명, 3건)	인과관계를 배제할 수 없는 중대한 약물이상반응 0%(0/3,247명, 0건)
드물게 (0.01%이상-0.1%미만)	중추 및 말초신경계 장애	두통	-
	근육 골격계 장애	관절통	-
	기타 용어	추간판탈출증	-

또한, 인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례와 인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물 이상반응을 발현빈도에 따라 다음의 표에 나열하였다.

발현 빈도	기관계	인과관계와 상관없는 예상하지 못한 이상사례 3.17% (103/3,247명, 총 129건)	인과관계를 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물이상반응 1.05% (34/3,247명, 36건)
흔하지 않게(0.1%이상~1%미만)	위장관계 장애	가슴쓰림, 위장장애	가슴쓰림
	전신적 질환	가슴불편함	-
	근육 골격계 장애	목/어깨통증	-
드물게 (0.01%이상-0.1%미만)	위장관계 장애	상복부통, 구강건조증, 대장염, 배변횟수증가, 복부불쾌감, 위장염	위장장애, 상복부통, 구강건조증, 대장염, 위장염
	중추 및 말초신경계 장애	무감각, 감각이상, 피부파괴, 가려움, 감각저하, 두통약화, 반응느림	감각이상, 감각저하, 두통약화, 반응느림
	전신적 질환	가슴통증, 다리통증, 말초부종, 사지통증, 상처치유장애, 얼굴부종, 골반통증, 찬느낌, 통증	가슴불편함, 다리통증
정신질환	성망, 수면장애	성망, 수면장애	수면장애
	피부와 부속기관 장애	땀샘질환, 습진성피부염, 홍반성발진	습진성피부염, 홍반성발진

드물게 (0.01%이 상~0.1% 미만)	근육 골격계 장애	관절통, 통풍증, 건초염, 근경련, 근육통, 요통악화	관절통
	호흡기계 질환	가래질환, 코막힘, 콧물, 코피	-
	기타 용어	낙상, 수술후통증, 관절탈구, 상세불명의잘과상, 추간판탈출증	-
	대사 및 영양 질환	고혈당증, 당뇨병, 당부하이상, 저혈당증	-
	방어기전 장애	방광염	-
	비뇨기계 질환	배뇨곤란	배뇨곤란
	일반적 심혈관 질환	혈압상승, 고혈압	-
	시각장애	눈통증, 안구이상	-
	생식기능 장애(남성)	사정감소	-
	특수기관 장애	쓴맛	쓴맛
	혈관 질환	홍조	-

3.3 국내 시판 후 승인된 중대한 이상사례 분석평가 결과 확인된 이상사례는 다음과 같다.

다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 면역계: 아나필락시스반응

3.4 의약품 시판 후 이상사례 보고자료(1989~2018년12월)를 토대로 실마리정보 분석평가 결과 새로 확인된 이상사례는 다음과 같다.

다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

- 피부 및 피하조직계-혈관부종

4. 일반적 주의

- 1) 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 감람 또는 투여를 중지한다.
- 2) 졸음, 주의력 · 집중력 · 반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

이 약의 유사약물인 연산토플레손과 메토카르바를 병용시 시소절장애가 나타났다는 보고가 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람하는 등 주의한다.

9. 의약품동등성시험 정보^{*1}

가. 급속시험

시험약 유리산SR서방정(에페리손염산염) [(주)제뉴파마]와 대조약 네렉손서방정(에페리손염산염) [대원제약(주)]을 2×4 반복교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 경구투여하여 39명의 혈중 에페리손을 측정된 결과, 대조약 Cmax의 시험대상자 개체 내 변동계수가 64%이었다.

비교평가 항목치(AUCt)를 로그 변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 치의 90%신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내이며, 비교평가 항목치(Cmax)를 로그 변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 치는 log 0.8에서 log 1.25 이내로서, 변동계수 64%에 해당하는 Cmax의 로그변환한 평균치 치의 90% 신뢰구간이 log 0.6984에서 log 1.4319 이내이므로, 의약품동등성시험기준 제17조제 4항에 따라 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24hr} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	네렉손서방정 (에페리손염산염) [대원제약(주)]	10.94± 22.65	2.475± 5.222	1.50 (0.50-8.00)	6.63±1.98
시험약	유리산SR서방정 (에페리손염산염) [(주)제뉴파마]	10.70± 19.52	2.359± 4.921	1.50 (0.50-8.00)	6.74±2.79

기준	90% 신뢰구간*		log 0.9276 ~ 1.2321	log 0.9255 ~ 1.3033	-	-
	AUC _t	log 0.8~ log 1.25				
	C _{max}	log 0.6984~ log 1.4319 (변동계수** 64%)				
로그변환한 평균치의 차			log 1.0690	log 1.0982	-	-
(AUC _t C _{max} , t _{1/2} /평균값±표준편차, T _{max} ;중앙값(범위), n=39)						
AUC _t : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도, T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 말단 소실 반감기 * 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간 ** 대조약 C _{max} 의 시험대상자 개체 내 변동계수(%) =100/ exp[(로그변환한 대조약 C _{max} 의 개체내 표준편차) ²]-1						

나. 식후시험

시험약 유리산SR서방정(에페리손염산염) [(주)제뉴파마]와 대조약 네렉손서방정(에페리손염산염) [대원제약(주)]을 2×4 반복교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 식후 경구투여하여 42명의 혈중 에페리손을 측정된 결과, 대조약 Cmax의 시험대상자 개체 내 변동계수가 31%이었다.

비교평가 항목치(AUCt)를 로그 변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 치의 90%신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내이며, 비교평가 항목치(Cmax)를 로그 변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 치는 log 0.8에서 log 1.25 이내로서, 변동계수 31%에 해당하는 Cmax의 로그변환한 평균치 치의 90% 신뢰구간이 log 0.7944에서 log 1.2589 이내이므로, 의약품동등성 시험기준 제17조제4항에 따라 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목		
		AUC _{0-24hr} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/ mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)	
대 조 약	네렉손서방정 (에페리손염산염) [대원제약(주)]	16.49± 71.03	5.559± 26.705	3.00 (1.00-6.00)	6.22±0.99	
시 험 약	유리산SR서방정 (에페리손염산염) [(주)제뉴파마]	16.09± 63.00	4.851± 19.779	3.00 (0.50-5.00)	6.21±1.22	
기 준	90% 신뢰구간*		log 0.9348 ~ 1.0413	log 0.9069 ~ 1.0511	-	-
	AUC _t	log 0.8~ log 1.25				
	C _{max}	log 0.7944~ log 1.2589 (변동계수** 31%)				
로그변환한 평균치의 차		log 0.9866	log 0.9763	-	-	
(AUC _t : C _{max} , t _{1/2} /평균값±표준편차, T _{max} :중앙값(범위), n=42)						
AUC _t : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도, T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 말단 소실 반감기 * 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간 ** 대조약 C _{max} 의 시험대상자 개체 내 변동계수(%) =100× exo[(로그변환한 대조약 C _{max} 의 개체내 표준편차) ²]-1						

*1 이 약은 (주)제뉴파마 유리산SR서방정(에페리손염산염)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정 (주)제뉴파마에 위탁 제조하였음.

저장방법: 기밀용기, 실온보관(1~30°C)

포장단위: 30정/병, 500정/병

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다. ※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다. ※ 의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여야 합니다. ※ 이 첨부문서 최초 작성일자(2025년 3월 28일)이후 변경된 내용은 “의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)”에서 확인하실 수 있습니다. ※ 제품 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재징계제부 고시 “소비자피해보상규정” 외의 소비자 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(☎1644-6223)

제조사: (주)제뉴파마 / 충청북도 제천시 바이오밸리2로 93

제조의뢰자: 위더스제약㈜ / 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 103 / Tel. 02-3486-7474