

일반의약품

조제용

분류번호 : 222

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

■ 유효성분: 아세틸시스테인(USP).....100mg

■ 첨가제(타르색소): 녹색 3호, 황색 203호

■ 기타 첨가제: 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 캡슐

[성 상]

흰색의 분말이 든 상부 녹색, 하부 흰색의 경질캡슐제

[효능·효과]

다음 질환에서의 객담배출곤란: 급·만성기관지염, 기관지천식, 후두염, 부비동염, 만성염증

[용법·용량]

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 복용한다.

1. 급성질환

성인: 1회 200 mg 1일 3회, 소아: 6~14세 1회 200 mg 1일 2회

2. 만성질환

성인: 1회 200 mg 1일 2회, 소아: 6~14세 1회 100 mg 1일 3회

3. 만성염증

소아: 6세 이상 1회 200 mg 1일 3회

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자

2) 위·십이지장 궤양 환자 3) 2세 미만 영아

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 임부: 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 임부 또는 임신 하고 있을 가능성이 있는 여성에는 반드시 필요한 경우에만 투여한다.

2) 수유부: 이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여한다.



진해거담제

뮤라텐 캡슐
100mg

Mueraten Caps 100mg

일반의약품

분류번호: 222

아세틸시스테인



300ea

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 소화기계: 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등 2) 과민 반응: 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등 3) 드물게 빈맥, 고혈압 4) 국내 자발적 유해사례 보고자료(1989 ~ 2013 상반기)를 분석한 결과, 유해사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 유해사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 유해사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다. · 호흡곤란

4. 기타 이 약을 복용 시 주의할 사항

1) 경구용 항생물질(아목시실린, 세프트록심, 독시사이클린, 에리트로마이신, 치말 페니콜)과 함께 복용 시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여한다). 2) 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피할 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관할 것.

※ 복용 전 반드시 첨부문서를 확인할 것.

※ <https://nedrug.mfds.go.kr> 참조

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 피해구제상담(14-3330)

[제조외탁자] (주)더유제약 경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-151 1~4층

[제 조 자] (주)메디카코리아 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 96

작성(개정)연월일: 2022.04.13

L220403-1

제조
번호
사용
기한

34x14mm



(01)08800570001924