

일반의약품 | KGMP적격업체



항산화 비타민, 셀레늄 함유 셀레뉴 연질캡슐 UDCA 사용



【원료약품 및 그 분량】1캡슐(1,620mg) 중

- 유효성분
- 아스코르브산(KP) 500,000mg
- 셀레늄 함유 건조 효모(셀레늄으로서 25μg)(별규) 19,231mg
- 레티놀 팔미테이트(비타민 A로서 2,000IU)(KP) 1,176mg
- 유비데카레논(KP) 5,000mg
- 우르소데옥시콜산(JP) 10,000mg
- 토코페롤 아세테이트(비타민 E로서 200IU)(KP) 200,000mg
- 산화아연(아연으로서 14mg)(KP) 17,430mg
- 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색호
- 기타 첨가제 : 공기를, 황납, 레시틴, 숙신산젤라틴, 농글리세린, 비결정성소르비톨액, 에틸바닐린, 산화티탄

【성 상】미황색(연노랑)의 내용물을 함유한 암색(검붉은 색)의 정방형 연질캡슐

【용법용량】만 12세 이상 성인 1일 2회, 1회 1캡슐을 복용

【효능효과】○ 다음 경우의 비타민 A, E, C의 보충

- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 눈의 건조감의 완화
 - 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)
 - 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(거미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방

【사용상의 주의사항】

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A결핍증 환자는 제외).

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경증 등을 중심으로 하는 기형발현(기형 발생) 증기가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보충을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장(콩팥)장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 동충환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통풍성 관절부종(부기), 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전혈관 막힘성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 장기간 고용량의 비타민 A(비타카로틴)로부터 전환된 것을 제외한 것을 제외(한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양증) 위험을 높일 수 있다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】60캡슐(10캡슐/7P*6)

【사용기간】제조일로부터 24개월

【판매원】삼진제약㈜ 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 52

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【소비자상담실】02-2002-9715

【제조원】㈜알피바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7

- ※ 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오
- ※ 유효기간 또는 사용기한이 지났거나 변질, 변태, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오

설명서 작성일자 : 2019.12.30

※ 위 일자는 설명서 작성일자로 사용기한과 관련이 없습니다

【판매원】SAMJIN 삼진제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 52

【제조원】RpBio 알피 바이오

경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7