

본태성 고혈압 치료제

에스카정 5/20밀리그램 · 5/40 밀리그램 · 10/40 밀리그램

【의료약품 분류법】 1중 에스카정5/20밀리그램	
· 유효성분: 임도다닌베스산염(USP임도다닌으로서 5mg)	6.944mg
· 율메시르테아데우스일(USP)	20.0mg
· 기타 첨가제: 규획미결정셀룰로오스, 스테아르산이그나숨, 오파드라이III 흰색(BF18422), 전호화천분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘	

에스카정5/40밀리그램	
· 유효성분: 임도다닌베스산염(USP임도다닌으로서 5mg)	6.944mg
· 율메시르테아데우스일(USP)	40.0mg
· 기타 첨가제: 규획미결정셀룰로오스, 스테아르산이그나숨, 오파드라이III 흰색(BF22033), 전호화천분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘	

에스카정10/40밀리그램	
· 유효성분: 임도다닌베스산염(USP임도다닌으로서 10mg)	13.888mg
· 율메시르테아데우스일(USP)	40.0mg
· 기타 첨가제: 규획미결정셀룰로오스, 스테아르산이그나숨, 오파드라이III 발간색(BF660007), 전호화천분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘	

- 성상**

 - 에스카정5/20밀리그램**: 흰색의 원형 필름코팅정제
 - 에스카정5/40밀리그램**: 연한 노란색의 원형 필름코팅정제
 - 에스카정10/40밀리그램**: 적갈색의 원형 필름코팅정제

【용법 · 용량】 임도다닌 또는 율메시르테아데우스일의 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압의 치료

용법 · 용량

이 약은 1일 1회 1정을 식사와 관계없이 물과 함께하여 하십시오. 기능하면 매일 같은 시간에 : 아침에 복용하는 것이 권장됩니다.

이 약을 투여하기 전에 개기의 성능(단독 치료 또는 율메시르테아데우스일과 용량을 조절할 것이 권장됨), 개기의 성능에 대한 단독요법으로 혈압이 조절되지 않는 경우 이 약으로 바로 전환하는 것을 고려할 수 있습니다.

이 약의 최대투여용량은 10/40밀리그램입니다. 최대 혈압감하효과는 투여 후 2주 이내에 나타나므로, 환자의 혈압변동을 고려하여 2주 이상의 간격을 두고 용량을 조절하십시오.

경감되는 투여용량은 다음과 같습니다.

- 5/20밀리그램: 임도다닌 단독 치료 또는 율메시르테아데우스일 20밀리그램 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여하십시오.

- 10/20밀리그램: 율메시르테아데우스일 20밀리그램 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여하십시오.
- 5/40밀리그램: 5/20밀리그램으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여하십시오.
- 10/40밀리그램: 5/40밀리그램으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여하십시오.

· 신장애 환자: 이 약은 신장애 환자에 대한 연구가 없습니다. 다만, 경증 및 중증증의 신부전 환자 (creatinine clearance 20-60mL/min)의 율메시르테아데우스일 최대투여용량은 1일 1회 20밀리그램이며, 중증증 - 중증 신장애 환자 (예 : creatinine clearance (20 mL/min) 및 투석 중인 환자)에 대해 이 약의 투여가 권장되지 않습니다. 중증증의 신부전 환자에 대해 칼슘치수 및 크레아티닌 수치가 대한 모든 노년상이 권장됩니다.

· 혈관 내 유출 혈액량 감소 환자: 혈관 내 유출 혈액량 감소 (intravascular volume depletion)의 가능성이 있는 환자에, 이노제 투여 후 학, 특히 신장애 환자는 신장애를 동반한 관혈하면서 낮은 용량에서 투여를 시작하는 것을 권장합니다.

· 간장애 환자: 경증 및 중증증의 간장애 환자에 투여시 주의하여야 합니다. 중증증의 간장애 환자에 율메시르테아데우스일 권장 총투여량인 1일 1회 10밀리그램이며, 최대투여용량은 1일 1회 20밀리그램입니다. 이 모든 환고혈압약을 및/또는 이노제를 투여하면 환자 중 간장애 환자는 혈압 및 신기능을 면밀히 모니터링해야 합니다. 중증 간기능 손상자에게 이 약을 투여해서는 안 됩니다. (사용상의 주의사항 참조) 다음 환자에 투여하지 마십시오.

- 고령자**: 일반적으로 낮은 용량에서 투여를 시작하여, 용량조절시 환자의 신기능 또는 신기능, 유양질환을 고려하여야 합니다. 고령자 인 경우 면밀하게 혈압을 더 자주 모니터링 해야 합니다.
- 수술**: 만 18세 미만의 소아환자에 대한 안전성 · 유효성이 확립되어 있지 않습니다.

사용상의 주의사항

1. 정제, 3.7인 입부에 레닌-안지오텐신에 직접 작용하는 약물 투여시, 태아 및 신생아에게 손상 및 사망까지 유발할 수 있습니다. 따라서 만일 임신으로 확인될 경우 즉시 이 약의 투여를 중단하여야 합니다. (7. 입부에 대한 투여 항목)

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 이 약의 주성분 및 비도다닌베스산염에 유도제에 과민증이 있는 환자 2) 일부 및 수유부 3) 중증의 간장애 환자 4) 중증의 대동맥판막증 환자 5) 대동맥판막염 환자 신장성부(신기능장애가 없음) 6) 수 환자 8) 알리스탄린 제제를 복용 중인 당뇨병 환자 및/또는 중증도 - 중증의 신장애(사구체과파율 (60mL/min/1.73m²) 환자) 8. 약물 상호작용 항목 참조

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 체액 또는 염류가 부족한 저혈압 환자율메시르테아데우스일 - 체액이나 염류가 부족한 환자에: 고용량의 이노제를 투여한 경우와 같이 레닌-안지오텐신계기 활성화하면 환자에게서 이 약을 투여할 초기에 저혈압 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 환자는 신장애를 동반한 관혈 하면서 신제를 투여해야 합니다. 만약 저혈압이 발생하면, 환자를 반듯이 눕히고 즉시로 생리식염수를 정적 정맥주사하십시오. 일시적으로 저혈압 반응이 나타나거나 해당 이노제 투여가 임상양상을 나타내는 것은 아니며, 일반적으로 혈압이 안정되면 별다른 어려움 없이 치료를 계속할 수 있습니다. 2) 혈관확장 - 이 약을 복용한 후 임도다닌에 의해 정적 혈관이 확장되어 급성 저혈압이 발생한 경우가 드물게 보고되었습니다. 다만, 만성 혈관확장제 같이 여러 중증의 대동맥 확장 환자에 이 약을 투여시 주의를 기울여야 합니다. 3) 중증의 패색성 관상동맥 환자 - 중증의 패색성 관상동맥 환자는 혈관질환 차치대 치료 기간 또는 용량 증가 시에 협심증이 급성심장질환의 빈도, 기간 또는 중증도 증가될 수 있습니다. 4) 우혈관 심부전증 - 일반적으로 칼슘채널 차단제 또는 신장 억제제에 주의하여 사용해야 합니다. 인지 오존트스 전신성 A(C)2 제제과, 다습성, 이노제의 용량에 인양화제 NYHA II 또는 III 단계의 심부전 환자 1153명을 대상으로 (1일 5-10mg)를 가지고 유위다조 임상시험결과 6개월, 평균 14개월을 실시한 결과, 생존 또는 사망 질환 발현(생존율)을 위험하는 무형대, 급성심장경증 또는 심부전 위험도 또한 일반적으로 정형대에 대한 영향은 없습니다. NYHA II 또는 III 단계의 심부전 환자 6872명을 8-12주 연속하여 임도다닌과 우위비 비교하였고 운동능력, NYHA 증상, 진통 또는 적심혈관질환(VEF) 측정이 심부전 약제에 대한 증거는 없습니다. 5) 신장애 환자 - 율메시르테아데우스일은 레닌-안지오텐신-알도스테론 계통 제제이기 때문에, 민감한 환자의 경우 신장 기능의 변화가 있습니다. 신기능이 레닌-안지오텐신-알도스테론 계통 약제와 함께 약제에 의해 신기능이 악화될 수 있으므로, 신기능을 정기적으로 평가하고 (드물게) 급성 신부전 및/또는 사망이 수반될 수 있습니다. 6) 이와 유사한 결과기 이 약을 투여한 결과에 나타날 수 있습니다. 단독 또는 이 약을 신장성질환 환자에게 ACE 제제를 투여한 약제에 혈장크레아티닌 농도와 혈중요소질소 (BUN)와 증가가 보고되었습니다. 이 약을 단독 또는 이 약을 신장성질환 환자에게 장기간 투여한 경우는 없었으나 비슷한 결과가 예상됩니다. 6) 간장애 환자 - 임도다닌은 2에서 광범위하게 대담하고 혈장 소실 반감기 4.65시간이 때문에 간장애 환자에게 이 약 투여시 주의해야 합니다. (용법 · 용량 항목 참조)

4. 아사발증

- 율메시르테아데우스일과 임도다닌의 복합제(1) 임상시험 결과 - 이 약의 안전성은 2,882명의 환자를 포함한 한 임상시험에서 평가되었습니 다. 임상시험은 신장애 환자에 대해 같이 1) 아사발증, 2) 대동맥동 다습성 및/또는 비동맥동 다습성, 3) 비동맥동 다습성, 4) 저용량증, 5) 저용량증은 지렁이 신장기능과 병행시 약위 효과에서 보였습니다. 매우 흔하게(≥ 1/10), 흔하게(≥ 1/100, <1/1,000), 때때로(≥ 1/1,000, <1/10,000), 드물게(≥ 1/10,000, <1/1,000), 매우 드물게(≥ 1/10,000), 알려지지 않은 빈도(혈중/기능 한 자료로부터 추정) 불가(가능)

발현부위	증상을 발현빈도			
	흔하게	때때로	드물게	알려지지 않은 빈도
면역계			알려진 반응	
다사 및 영양	고칼혈혈증			
장기계	소양감			
신경계	이차저용(azures), 두통	허위성 저혈압, 졸음, 자지아실, 자각증	실신	
순환기계	체위성(ortop)			
심장	가슴두근거림, 빠른 맥			
혈관계	저혈압, 가림성 저혈압			
호흡기계 및 흉부	호흡곤란, 기침			
유방관계	유방, 구토, 소화불량, 설사, 변비, 입냄, 상부부 통증			
피부 및 피부조직	발진		두드러기	
신장 및 배뇨기계	빈뇨증			
생식 및 배뇨계	발기부전			
전신 및 투여부위	열조 부종, 율증, 율증, 율증, 락	우두종		알려부종
감시(시)	혈중칼륨결함, 혈중 크레아티닌증가, 혈중요소 증가, 김아클루루틴혈증소 증가			해모글로빈 및 헤마토크릿증가

2) 국내 시판 후 조사 결과 ① 국내에서 재사용을 위하여 6년 동안 1,172명을 대상으로 실시한 후조사 결과, 유해사례 발현율은 인과 관계와 상관없이 4.61%(54/1,172명, 662주)로 유해사례 발현율은 0.43%(4/1,172명, 52주)로 나타났다. 감색증, 여성유방신생물, 뇌경색(뇌혈), 잇몸출혈이 각각 0.00%(1명, 12주) 보고되었으며, 이 약과 인과관계를 배제할 수 있는 중대한 약물에 비해 반응은 없었습니다. 예상하지 못한 유해사례 발현율은 인과관계와 상관없이 1.172명, 272주로 보고되었으며 재투여시 부작용 0.26%(3명, 32주), 가슴불증, 갑갑기 각각 0.17%(2명, 22주), C/P부종, 기, 객혈, 재파기과, 콧물, 후두염, 관혈증, 전신성통, 저혈당증, 저칼슘증, 가슴쓰림, 위장염, 단석증, 대장조각, 복식, 여성유방신생물, 발관증, 뇌경색(뇌혈), 잇몸출혈이 각각 0.00%(1명, 12주로 조사되었습니다. 이 중, 이 약과 인과관계 배제할 수 없는 예상하지 못한 약물유해반응 발현율은 0.51%(5명, 72주)로 나타났다. ② 이 약에 대한 국내 재사용 유해사례 0.26%(3명, 32주, 후두염, 관혈증, 전신성통, 가슴쓰림이 각각 0.00%(1명, 12주로 보고되었습니다. ③ 이 약에 대한 국내 재사용 유해사례 및 자발적 부작용 보고자료를 국내 시판 877주 모든 약작용을 대상으로 보고된 유해사례 보고자료와 재사용 종료시험에서 통합한 결과에 결, 다른 모든 약작용에서 보고된 유해사례에 비해 이 약에서 통적작용이 보고된 유해사례는 없었습니다. 2) 율메시르테아데우스일 - 유위다조 임상시험에서 율메시르탄 메독스일을 투여한 환자에서 1% 이상 나타. 고 유위 투여환자보다 더 빈번하게 발현된 이상반응은 이차저용(azures)에 투여한 환자에서는 유사하거나 더 높은 발현율 보인 다른 이상반응들은 오름, 기침, 두통, 두드러기 · 간장애 증례 · 자기면역성간염 · 및 개혈에서 수년까지의 정박기 있는 자기면역성간염이 국외 시판 후 사례로 보고되었습니다. 이러한 사례는 율메시르탄 탄부터 중증 후 기역하였으나, · 감시자: 고혈혈증, 신장기능 · 12의 통분된 임상시험 및 역향연구 자료이며, 고용량의 율메시르탄이 당노환자에게 심혈관 위험을 증가시킬 수 있음이 알려졌다. 이는 확증되지 않았습니다. 2) 우적위, 위양제과, 이중검증 ROADMAP (Randomized Omesaran And Diabetes Microalbumin Prevention) 연구는 제형당 당, 정형당부인과 및 최소한 7가지 이상의 추가적인 심혈관계 위험 인자를 가진 4,447명의 환자를 대상으로 율메시르테아데우스일을 1일 40mg 또는 유위를 투여한 연구입니다. 이 임상시험에서 율메시르테아데우스일은 미세알부민뇨의 발병 시점을 지연시키 주당기변수를 충족시켰으나, 자체 제어율 (GFR)값에 대한 영향은 없었습니다. 다습성질환환으로 인한 임상시험결과, 신장기능 손상증, 저칼슘증, 저칼슘증, 저칼슘증은 유위과도 비비하여 율메시르테아데우스일에게 증가되었습니다 (율메시르테아데우스일과 15명, 유위과 3명, HFR-43, 95% CI 1.4-17.0). 그러나 비직접적 신장경증의 위험은 율메시르테아데우스일에서 낮았습니 다(HFR-0.64, 95% CI 0.35-1.18). 7) 자적인 안전성 평가는 율메시르테아데우스일 단독제 하사혈을 참조하십시오. 3) 임도다닌 - 고혈압 및 협심증 환자에 대한 실신타인 임상시험에서, 가장 흔하게 나타난 이상반응들은 다음과 같습니다. · 혈관계 · 전신 락로, 부종 · 신장기능 · 가슴근거림 · 중증 및 말초신경계 · 한기증, 두통, 졸음 · 소화기계 · 부종, 구역 · 임상시험에서 이 약과 연동되어 임상작용으로 유익한 심혈관계학이 이상은 관찰되지 않았습니다. 시판 후 유위시 이상형 율압이 드물게 보고되었으며, 임도다닌과의 인과관계는 명확하지 않습니다. 또한 혈압 및 간기능 손상 (대부분 담낭관비장애 또는 간염과 일치함)이 임도다닌 투여와 관련 있는 것으로 보고되었으며, 일부의 경우는 임압이 필요없이 림를 나타냈습니다. 2) 혈당구 감소증, 혈산관진소증, 독성패피과 사음용과 보고되었습니다(빈도불분명). 추가적인 안전성 정보는 임도다닌 단독제 하사혈을 참조하십시오.

5. 일반적 주의

- 배타 치료제의 투여중지 - 임도다닌은 배타 차단제이기 이므로 배타치단제의 투여를 갑자기 중지증례를 경우 발생하는 약원이 나타날 수 있습니다. 배타치단제 투여 중지시 배타 차단제의 양을 서서히 감소해야 합니다. 2) 레닌-안지오텐신-알도스테론 제제 - 혈관 긴장도 (tono) 및 신기능이 주로 레닌-안지오텐신-알도스테론계에 좌우되는 지에, 예: 중증의 우울혈성 심부전, 신동맥 협착증과 같은 신장 질환 환자의 경우에는 이 제제 영향을 미치는 다른 약물과 병용투여가 저혈압, 고소스혈증, 소변간소증, 고칼슘혈증, 고칼슘혈증과 관련 될 수 있습니다. 3) 신장기능 고혈압 환자 - 단독 또는 이 약을 신장성신동맥질환 환자에게 임도다닌(레닌저해제 A(C)2 제제)을 사용 한 환자에서 신기능을 평가하는 방법: 율혈압을 나타내는 것입니다. 4) 고혈혈증 - 레닌-안지오텐신계 약제와 병용하는 것은 약물이 나타내지, 신장기능 그리고/또는 심부전 환자에 이 약 투여시 고혈혈증으로 나타날 수 있습니다. 혈중 칼륨치를 증가시킬 가능성이 있는 약들과 병용시 혈중 칼륨치에 대한 면밀히 모니터링이 요구됩니다. 5) 대동맥 및 승문판 질환, 폐색 · 비후성 심근 질환 - 다른 혈관질환과 대동맥 질환에 대담하 나 소동맥 협착증 환자는 폐색 · 비후성 심근증 환자에게 특별한 주의가 필요합니다. 6) 완혈성알도스테론증 - 알도스테론 완혈성알도스테론증이라는 증례는 레닌-안지오텐신계를 억제하는 항고혈압약물에 대해서 반응성이 없으며 이런 환자에게 약을 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 7) 임신 - 임신기간 안지오텐신 II 수용체 길항제 투여를 시작하는 안 됩니다. 만약 안지오텐신 II 수용체 길항제의 사용 적 치료가 필수적이지 않다면, 임신을 계획 중인 환자는 임부의 사용에 대해 안전성 프로파일임이 확립된 다른 고혈압 치료제로 대체하여야 합니다. 임압이 전전된 임신은 기능한 율도다닌으로 신: 2) 수용체 길항제의 투여를 중단하여야 하며, 만약 적절하면, 다른 치료제로 치료를 시작하여야 합니다. 8) 만성혈중 수분결핍(Smuel) 유사 증형증: 후속적 수유제에 대해 이 약을 복용할 수 가 없습니다. 수 가 없습니다. 현재까지 지렁이 증형증의 임상 실기 발생빈도 1회 보고되었습니다. 환자의 장 조직감에서 음운-음속 기하 관혈되었습니다. 환자의 장 조직에 음운-음속 증형증은 자주 있는 경우, 즉시 이 약의 투여를 중단하고 다시 복용하지 않아야 합니다. 이 약의 투여 중단 후 일주일 동안 실기(diarhea)가 개선되지 않을 경우, 추가적인 진료(예, 소화기 내과 전문의)의 조언을 고려해야 합니다. 9) 가 - 하혈성 질환 또는 하혈성 뇌혈관질환 환자에게 드문한 혈압간소화로 인하여 신경경증 또는 뇌졸중이 발생할 수 있습니다.

6. 약물상호작용

- 임도다닌 및 율메시르탄 메독스일 병용시 유익한 약동학적 상호작용이 나타나지 않았습니다. 이 약과 다른 약들과의 약물 상호 작용에 대한 연구는 실시되지 않았습니다. 2) 임도다닌 ① 임도다닌의 경우 타이저제 이노제, 임피치제, 배타치단제, 율메시르테아데우스 (ACC)제제, 심장성기간 긴질산염제제, 니트로글리세린 혈하정, 비스테로이드성 소염제, 항생제, 경구 혈당강화제와 병용시 안전하였습니다. ② 안지오텐신을 이용한 심혈관질환자로 임도다닌과 다습, 페도민, 와비린, 인도메타신의 다제합전에 영향을 미치지 않는 것이 을 알려졌다. ③ 저용량증: 임도다닌은 지렁이 신장기능과 병행시 약위 효과에서 보였습니다. 매우 흔하게(≥ 1/10), 흔하게(≥ 1/100, <1/1,000), 때때로(≥ 1/1,000, <1/10,000), 드물게(≥ 1/10,000, <1/1,000), 매우 드물게(≥ 1/10,000), 알려지지 않은 빈도(혈중/기능 한 자료로부터 추정) 불가(가능)

여시 임도다닌의 약동학에 유익한 영향이 없었습니다. - 실례: 락로: 원형성 고혈압환자에 실례: 락로 100 mg 단회용량의 투여는 임도다닌의 약동학 파라메타에 영향을 미치지 않았습니다. 임도다닌과 실례: 락로를 병용 투여 시, 각 약물은 단독으로 각각 혈장정도를 발현합니다. - 사이토크롬 P3A4 제제과: 사이토크롬 P3A4 제제제와 병용투여(증은 신장애에 메타르도마신 및 고령자에서 달리아)를 시 임도다닌의 혈장농도가 각각 22%, 및 50%까지 증가하였으나, 임상적인 연관성은 발견된 바 없습니다. 강력한 사이토크롬 P3A4 제제제, 케토코나졸, 이트라코나졸, 리토·비어가 임도다닌의 혈장 농도를 달리아혈과의 병용투여에서 나타난 것보다 더 높은 수치로 증가 시킬 가능성이 배제할 수 없습니다. 임도다닌은 사이토크롬 P3A4 제제제와 병용투여시 주의하여 투여하십시오. 그러나, 이 약은 율혈소산증 용으로투여 7기간 이상반응은 보고된 바 없습니다. - CYP3A4 유도제: CYP3A4 유도제과, 락림파신, 세인트존스 워드(pernium perfoliatum)와의 병용투여는 임도다닌의 혈장농도를 변화시키 수 있습니다. 그러므로 특히 강력한 CYP3A4 유도제과 병용하는 것은 및 그 이후에 혈압을 모니터링하고 용량 조절을 고려해야 한다. ② 임도다닌이 다른 약물에 미치는 영향 - 테르부타살린, 이도라크소스, 타민 80 mg과 임도다닌 10 mg 다회용량을 병용투여 시 이도라크소스타민의 항정 약동학적 파라메타에 유익한 변화가 없었습니다. - 디곡신: 정상이 지렁이에서 임도다닌과 다습산을 병용투여 시 혈당다습산의 수치 혹은 다습산의 신장 클리어런스에 변화가 없었습니다. - 메티릴알로콜: 10 mg 임도다닌의 단회 및 반복투여시 메티릴의 약동학에 유익한 변화가 없었습니다. - 와비린: 임도다닌과 와비린의 병용투여 시 와비린 프로트린분 변용시간에 영향이 없었습니다. - 사이클로포란: 사이클로포란에 대한 약동학 시험에서 임도다닌이 사이클로포란의 약동학을 유익적으로 변화시키지 않았습니 다. 3) 율메시르탄 메독스일 ① 칼륨 보충제 및 칼륨 보충 이노제: 레닌-안지오텐신 신계에 작용하는 다른 약물들의 투여를 살펴보면, 칼륨보충 이노제, 칼륨보충제, 칼륨결함을 함유하고 있는 제제 또는 혈당결함증을 증가시킬 수 있는 제제(메타다닌)와 이 약을 병용투여할 경우 혈당결함증은 상승할 수 있습니다. ② 다른 혈고혈압제와 병용투여시 이 약의 혈당상하 효과는 중7될 수 있습니다. ③ 락로: 안지오텐신전환효소(ACE)제제와 락로를 병용 투여할 경우 혈당 락로이 7가지까지 오를 수. 복속 이 나타나는 보고가 있습니다. 이 약에서도 이러한 현상이 매우 드물게 보고되었으며 이 약과 락로의 병용투여는 권장되지 않습니다. ④ 비스테로이드성 소염진통제: 다른 안지오텐신 II 수용체 길항제와 비스테로이드성 소염진통제 (예 : 1일 320 mg)의 아사프린, COX-2 제제과 병용시 사구체과파율 감소기 증가될 수 있습니다. 이러한 위험성은 급성 신부전환자에서 증가됩니다. 때때로, 치료를 시작 할 때 수분을 보충하여 신기능을 모니터링해야 할 것일 수 있습니다. 또한 안지오텐신 II 수용체 길항제와 마찬가지로 이 약의 혈당상하 작용은 비스테로이드성 소염진통제에 의해 약해질 수 있습니다. ⑤ 레닌-안지오텐신계의 이중 차단제인안지오텐신 수용체 차단제(사비), 단독 사용은 혈조 호소(혈압(ACC) 또는 안지오텐신 II의 병용투여에 의해 레닌-안지오텐신계(renin-Angiotensin system)의 이중차단은 인공 유발과 비교지 저혈압, 고혈혈증, 신기능 변화(급성 신부전 포함) 위험을 증가시키는 것과 관련이 있습니다. 그러므로 이 약과 안지오텐신 신계에 작용하는 다른 약물을 병용투여하는 환자의 경우 혈압, 신기능 및 전혈장농도 등 환자의 상태를 면밀히 관찰해야 한다. 당뇨병 환 자 및/또는 신장애 환자(사구체과파율<60mL/min/1.73m²)에게 이 약과 알리스탄린 제제를 병용투여하지 않습니다. ⑥ 가: 율메시르탄 메독스일을 강력한 지렁이에서 다습성 또는 와비린과 병용투여 했을 때 심장근 약을 상호작용은 보고되지 않았습니다. 율메시르탄 메독스일의 생체이용률은 제산제 (Al(OH)3/Mg(OH)2와 병용 투여시 크게 변화하지 않았습니 다. 이 약은 cytochrome P450 시스템에 의해 대담히 지압되며 P450 효소와도 영향을 주지 않습니다. 따라서 이 효소에 의해 억제되거나, 유도 또는 대사되는 약물들과의 상호작용은 예상되지 않습니다.

7. 입부에 대한 투여

1) 율메시르탄 메독스일: 레닌-안지오텐신 계제 직접작용하는 약물은 입부에게 투여하면 경우 태아 및 신생아의 손상 및 사망을 유발 할 수 있습니다. 안지오텐신 전환효소(ACC)2 제제제과 병용한 환자의 경우에서 수전 전신사해가 보고되었습니다. 임신이 발생한 경우 가능한 빨리 이 약의 복용을 중단해야 합니다. 레닌-안지오텐신계제 직접 작용하는 약물 임신 27주와 37주에 투여하면, 저혈압, 신생아의 두 개를 미성상, 무호흡, 기역적 또는 비기역적 신생아 사망 등을 포함하는 태아의 손상을 유발할 수 있습니다. 태아의 사생 7주 제제와 연관 것으로 생각되는 양수과소증이 보고되었습니다. 이 경우 양수과소증은 태아의 사기,구토, 복통, 두개골내 출혈, 패혈증부종과 관련이 있습니다. 이 약에 의한 안지오텐신 효소화하지는 않습니 다. 사: 다습, 다습성간염, 동맥관 개조증으로 보고되었습니다. 이러한 이상반응은 임신 17주 이하 여아에게 관찰되는 증례에는 나타는 것 간지 있습니다. 임신 17주 동안에 태아(가) 안지오텐신 II 수용체 제제제과 노출된 경우도 입부에게 그 사실을 알려야 한다. 그럼에도 불구하고 환자가 임신증례를 경우 의사는 환자가 가능한 빨리 임의 사용을 중단하도록 해야 합니다. 드문 경우(임신 0.1%보다 낮은 비율) 레닌-안지오텐신 계제 작용하는 약을 테르부타살린에 있을 수 있습니다. 이러한 환 상은 태아에게 가질 수 있는 잠재적인 위험을 잘 알고 있어야 하며, 반작용적인 초음파 감사를 통해 양수-과로 상태를 파악하고 있어야 합 니다. 만약 양수과소증이 관찰되었을 경우, 이 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 이러한 증례자에게, 임신중증과 다 라지증수증(Contraction stress testing(CST)) 또는 Nonstress test(NTST) 또는 생리학적 프로파일로그(Biophysical profile(BPP)) 등이 적절히 실시되어야 합니다. 환자와 의사는 태아가 비기역적 손상을 받은 후에도 양수과소증이 나타나지 않을 수 있음을 주의해야 합 니다. 지렁이에서 안지오텐신 II 수용체 제제제과 노출된 증형이 있는 유위 의 경우, 제형증, 소변간소증, 고칼슘증이 나타는 것이 면밀히 관 찰해야 합니다. 락로증: 발한반한 혈압과 신장관류를 저하시키는 데 주의를 기울여야 합니다. 수혈기 시 저혈압을 유발하거나 소산된 신장기능을 대담하기 위한 수혈제로 필요할 수 있습니다. 2) 율메시르탄 메독스일을 이용한 제제에 1,000mg/kg/day (mg/day)의 수혈제로 필요할 수 있습니다. 3) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 4) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 5) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 6) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 7) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 8) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 9) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 10) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 11) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 12) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 13) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 14) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 15) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 16) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 17) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 18) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 19) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 20) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 21) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 22) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 23) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 24) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 25) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 26) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 27) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 28) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 29) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 30) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 31) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 32) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 33) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 34) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 35) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 36) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 37) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 38) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 39) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 40) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 41) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 42) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 43) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 44) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 45) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 46) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 47) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 48) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 49) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 50) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 51) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 52) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 53) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 54) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 55) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 56) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 57) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 58) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 59) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 60) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 61) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 62) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 63) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 64) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 65) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 66) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 67) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 68) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 69) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 70) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 71) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 72) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 73) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 74) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 75) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 76) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 77) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 78) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 79) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 80) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 81) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 82) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 83) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 84) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 85) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 86) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 87) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 88) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 89) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 90) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 91) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 92) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 93) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 94) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 95) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 96) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 97) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 98) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 99) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 100) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 101) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 102) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 103) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 104) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 105) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 106) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 107) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 108) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 109) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 110) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 111) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 112) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 113) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 114) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 115) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 116) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 117) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 118) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 119) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 120) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 121) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 122) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 123) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 124) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 125) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 126) 임신 산모의 병용작용을 면밀히 검토 필요할 것일 수 있습니다. 127