


원료약품 및 분량 (1캡슐 중)

- 유효성분 : 세티리진염산염(BP) 10.00mg
- 첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호
- 기타 첨가제 : 부분탈수유동소르비톨, 수산화칼륨, 숙신산젤라틴, 에틸바닐린, 정제수, 포비돈, 폴리에틸렌글리콜 400, 프로필렌글리콜

성상



효능·효과

계절성 및 다년성 알레르기성 비염(코염), 알레르기성 결막염, 만성 특발성(원인불명) 두드러기, 피부 소양증(가려움증)

용법·용량

1. 성인 및 6세 이상의 소아 : 세티리진염산염으로서 1일 1회 10mg 취침 전에 경구투여합니다.(복용합니다).
2. 이상반응에 민감한 환자의 경우는 5mg씩을 아침, 저녁에 투여합니다.
3. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.
4. 중등도 ~ 중증(심한 증상)의 신장장애(신장장애) 환자 : 투여 간격은 환자의 신기능에 따라 조절되어야 합니다. 다음 표를 참조하여 용량을 조절합니다. 이 용량 표를 사용하기 위해서는 mL/min 단위의 크레아티닌 청소율 (CL_{Cr})이 필요합니다. CL_{Cr} (mL/min)은 다음 공식을 이용하여 혈청 크레아티닌 (mg/dL) 측정치로부터 계산됩니다 :

$$CL_{Cr} = \frac{[140 - \text{연령(나이)}(\text{세})] \times \text{체중(kg)}}{72 \times \text{혈청 크레아티닌(mg/dL)}} \quad (\text{여성인 경우} \times 0.85)$$

[신기능이 손상된 성인 환자에 대한 용량 조절]

구분	크레아티닌 청소율(mL/min)	용량 및 빈도
정상	≥80	1일 1회, 10mg
경증(가벼운 증상)	50~79	1일 1회, 10mg
중등도	30~49	1일 1회, 5mg
중증(심한 증상)	< 30	매 2일마다 1회, 5mg
말기 단계의 신 질환을 가진 투석중인 환자	< 10	금기

신장장애(신장장애)를 가진 소아 환자는 환자의 신 청소율과 체중을 고려하여 개별적으로 용량을 조절해야 합니다.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오. 1) 이 약 및 히드록시진 또는 피페라진 유도체에 과민증 및 그 병력이 있는 환자 2) 산부전 환자(크레아티닌 청소율 < 10mL/min) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부 4) 6세 미만의 유아 2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오. 1) 테오필린(1일 1회, 400mg)과 세티리진의 다회 투여 연구에서 테오필린의 약물동태는 세티리진과 함께 투여시 변화되지 않은 반면, 세티리진의 청소율은 약 21%(16%) 감소하였습니다. 2) 리토나비어(600mg, 1일 2회)와 세티리진(1일 10mg)의 다회 투여 연구에서, 리토나비어의 분해는 세티리진과 함께 투여시 약간 변화 (-11 %)된 반면, 세티리진에 대한 노출 정도는 약 40 % 증가하였습니다.

※1241101-1190918

3. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오. 1) 이 약이 모유를 통해 미량 분비되므로 투여 중에는 수유를 중단합니다. 2) 다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 함께 투여하지 않습니다.
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 1) 신장에 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다) 2) 간장에 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다) 3) 노인(높은 혈중 농도가 지속될 수 있습니다) 4) 이 약의 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 노인에서는 혈중 농도 과다상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량하거나 복용중지하고 적절한 처치를 합니다. 5) 간질 환자 및 발작 위험성이 있는 환자 5) 이 약은 소변고임의 위험을 증가시킬 수 있으므로 소변고임의 선양요인(예: 척수 병변, 전립선 비대증)이 있는 환자에게 사용시 주의하여야 합니다.
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 과량투여시의 증상 및 처치 - 증상 : 세티리진의 과량 투여 후에 관찰된 증상들은 주로 중추신경계 영향 또는 항콜린성 효과로 여겨지는 영향과 관련되어 있습니다. 1) 경정용량의 최소 5배를 복용한 후에 보고된 이상반응은 다음과 같습니다: 혼돈, 설사, 어지러움, 피로, 두통, 권태감, 동공확대, 가려움증, 초조, 진전, 졸림, 혼미, 빠른맥, 떨림 및 소변고임. - 처치 : 세티리진에 대한 특별한 해독제는 알려져 있지 않습니다. 만일 본 약물을 과량 투여한 경우에는, 증상에 따른 치료 또는 보조 치료가 권장됩니다. 복용한 지 얼마 되지 않은 경우에는 위 세척을 고려해야 합니다. 세티리진은 투석에 의해 효과적으로 제거되지 않습니다. 2) 정신신경계 : 졸음, 두통, 때때로 권태감, 마비감, 무력증, 초조, 감각이상, 드물게 가변적 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 머리무거움, 흥분, 경련, 운동이상, 근육긴장이상, 실신, 떨림, 공격성, 혼돈, 우울, 환각, 불면증, 틱 장애, 기억상실, 기억장애, 자살관념이 나타날 수 있습니다. 3) 소화기계 : 때때로 목마름, 입술건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 소화불량, 복통, 위통, 복부불쾌감, 설사, 드물게 구토, 위장장애, 입술염, 미각이상, 식욕증진이 나타날 수 있습니다. 4) 순환기계 : 드물게 빠른맥, 부정맥, 혈압상승, 때때로 두근거림이 나타날 수 있습니다. 5) 혈액 : 혈관염, 때때로 백혈구 감소, 호중구 감소, 림프구 증가, 호산구 증가, 드물게 단백 증가, 혈소판 증가가 나타날 수 있습니다. 또한 드물게 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 관질을 충분히하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 합니다. 6) 연역계, 피부 및 피하조직 : 광과민증, 드물게 과민증 및 과민성 쇼크, 때때로 부기, 가려움, 발진, 드물게 두드러기, 혈관부기, 고장악물 발진이 나타날 수 있습니다. 7) 눈 : 드물게 흐린 시력, 결막충혈, 안조절 장애, 전후축의 안구운동(oculogyration)이 나타날 수 있습니다. 8) 귀 및 미로 : 현기증 9) 간 : 때때로 AST, ALT, ALP, 총빌리루빈, γ-GTP, LDH의 상승 등 간기능 장애(초기증상 : 전신권태감, 식욕부진, 발열, 구역 등), 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다. 10) 신장 : 때때로 BUN 상승, 당뇨, 피식인 소변, 드물게 배뇨 곤란, 뇨중증, 소변고임이 나타날 수 있습니다. 11) 기타 : 인두염, 기침, 코피, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 가슴통증, 드물게 월경불순, 귀울림, 비염, 체중 증가가 나타날 수 있습니다. 12) 세티리진 투여 중단 후, 일부 환자에서 가려움증 및/또는 두드러기가 보고되었습니다.
6. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항 1) 이 약은 알레르기항원내반응을 억제하므로 알레르기항원내반응검사를 실시하기 3~6일 전에는 이 약을 투여하지 않는 것이 바람직합니다. 2) 간간장 지원자에게 1일 20~25 mg를 투여한 결과, 민첩성이나 반응시간에 어떠한 부작용도 나타내지 않았으나 운전이나 기계조작 시에는 용량을 초과하지 않습니다. 라세미제(광학이성체)가 알코올의 영향을 증가시키지 않을 것으로 보여지나(0.5 g/L 혈액 수준), 알코올을 투여한 후 CNS 억제제를 병용 투여하면 경계성이 추가로 감소될 수 있고 수행 장애를 야기할 수 있습니다. 3) 증상에 따라 이 약으로서 1일 10mg 투여로 개선이 없을 경우, 의사 또는 약사의 지시에 따라 1일 20mg까지 투여한 임상보고가 있습니다. 4) 세티리진의 흡수 속도는 음식물에 의해 1시간 정도 감소되지만, 흡수 정도는 감소되지 않습니다.
7. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품의 잘못된 사용에 따른 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 10캡슐

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. ※ 이 설명서는 2019년 9월 18일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다. ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

제조의회사 : ILDONG 일동제약주식회사

제조사 : ㈜알피바이오

본사 서울특별시 서초구 바우포로 27길 2

경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7

공장 경기도 안성시 공단로 25

소외자상담실 : (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※1241101-1190918