

소렉신 캡슐

일반의약품

【제품명】소렉신캡슐(구동해독당)

【원료약품 및 그 분량】1캡슐(623mg) 중

■ 유효성분

방	중(KP)	500mg	강	활(KP)	250mg	
우	방	자(KP)	500mg	강	초(KP)	250mg
연	교(KP)	835mg	길	경(KP)	500mg	
형	개(KP)	250mg	석	고(생규)	1,665mg	

이상물건조엑스 503.5mg

이상물건조엑스 503.5mg

■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소·우유)

■ 기타첨가제 : 캡슐, 콜로이드성아산화규소, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘

【성상】갈색의 가루가 충전된 상부 임질제, 하부 흰색의 경질캡슐제

【효능·효과】인후(목구멍)가 부어서 아픈 다음 증상 : 편도염, 편도주위염

【포장단위】200캡슐/병, 10캡슐(10캡슐/PTP X 1ea)

【용법·용량】보통 성인 1회 2캡슐, 1회 7~14세 성인 용량의 3/4(4캡슐) 4~6세 성인 용량의 1/2(2캡슐) 2~3세 성인 용량의 1/3(1캡슐) 1세 이하 성인용량의 1/4(1캡슐)을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 미지근한 물에 녹여서 임이나 목 등을 적서가면서 소량씩 천천히 복용한다(캡슐로 삼키지 말 것).

【저장방법 및 사용기간】기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기)
- 2) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장병(심장장애) 또는 신장병(신장장애) 환자
- 3) 부종(부기)환자
- 4) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것)
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여받고 있는 환자)
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 7) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자)(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다)
- 8) 위장이 허약하고 설사하기 쉬운 환자(식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 묽은변, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 9) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 10) 1세 이하의 영아(젖먹이, 갓난아기)(의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 말 것.)
- 11) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
(1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈안상승, 나트륨 체액의 저류(고염, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것)
(2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
(3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
(4) 소화기계 : 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감, 묽은 변, 설사 등
(5) 5-6회 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로로메타이아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것
- 4) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중독에 주의할 것
- 5) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것이 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.