

진해거담제

일반의약품 | 조제용 | 분류번호 222

엘도비 캡슐

(에르도스테인)

【성분·함량】 1캡슐 중

- 유효성분 : 에르도스테인(별규) 300.0mg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호, 황색5호
- 첨가제(동물유래) : 젤라틴(돼지·돈피, 소·우내피)
- 기타 첨가제 : 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나르툼, 캡슐(상부녹색, 하부황색)

【성상】 흰색~유백색의 결정성 분말이 들어있는 상부 녹색, 하부 황색의 경질캡슐

【효능·효과】 급·만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담

【용법·용량】 1일 2~3회, 1회 1캡슐씩 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것

- 1) 동성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 동성분의 대사물이 메치오닌 대사를 방해할 수도 있으므로 간경변 환자와 시스타치오닌 합성효소(cystathionine-synthase) 결핍환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 이상반응

- 1) 사용량(1200 mg/일)보다 과투여시 발한, 현훈, 조홍이 나타났다.
- 2) 국내 시판후 조사결과(조사증례수 : 캡슐제3,303명, 시럽제 791명) 보고된 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않다. : 피로, 소화불량, 복통, 위장장애, 설사, 구토, 오심, 두통, 신물이 올라옴, 결절성 홍반, 심계항진, 안면부종, 전신부종, 가려움증, 무력감, 몽롱함, 발진

4. 상호작용

항생제, 기관지확장제(테오필린, β 2-효능약, 기침완화제(cough sedative)등)와 병용할 수 있다.

5. 임부·수유부에 대한 투여

임신중, 수유부에의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않기 때문에 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에게는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

【포장단위】 30캡슐/병, 300정/병

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

※ 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 본 의약품의 적절한 사용에도 불구하고 부작용 발생시, 한국 의약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

〈이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com에서 확인할 수 있습니다.〉

작성일자 : 2019. 10. 11
PM.102425(00)

【제조사】 (주)한국글로벌제약

충청남도 서천군 중천면 중천공단길32번길 26

【제조의뢰자】 (주)서울제약

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31

● ■ seoul
pharmaceuticals