

렉스민캡슐 (디오스민)

K G M P

일반의약품

■ 원료약품 및 그 분량 1캡슐 중

- 유효성분: 디오스민(KP) 300 mg
- 첨가제(타르색소): 황색203호, 녹색3호
- 첨가제(동물유래성분): 젤라틴(소 또는 돼지의 가죽)
- 기타첨가제: 캡슐, 포비돈

■ 성상

상, 하 녹색의 경질캡슐로서 내용물은 황색분말로 냄새는 없고 맛은 쓰다.

■ 효능·효과

1. 치질
2. 다음 질환에 의한 여러 증상(하지중압감, 동통, 부종 등)의 개선: 정맥류, 정맥부전(임신시 포함), 정맥염후후종군
3. 모세혈관취약증에 의한 출혈증상: 자반증

■ 용법·용량

성인: 디오스민으로서 1회 300mg 1일 2회(점심, 저녁식사시) 경구투여한다. 치질의 재발이나 악화시에는 1일 1200~1800mg까지 투여할 수 있다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약에 과민증 환자
2. 부작용
위장장애, 과민성 피부발진, 심계항진, 어지러움, 두통, 코·입의 건조감 등이 나타날 수 있다.
3. 임부에 대한 투여
임신초기 3개월 이내에는 투여하지 않는다.

■ 저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ 사용기간 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 30캡슐/병, 300캡슐/병

■ 제조자

☞ **조아제약(주)** / 경상남도 함안군 함안면 광정로 318

■ 제조의뢰자

☞ **(주)시아스제약** / 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 32

※ 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오.

※ 본 의약품은 "우수의약품제조관리기준(KGMP)"에 따라 엄격하게 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다.

※ 이 설명서 작성(개정)일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 의약품을 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 기타 자세한 사항이나 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자가상담실(070-8822-7755)로 문의하시기 바랍니다.

※ 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223)

작성일자: 2022.11.17.(00)