

※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

일반 의약품
분류번호: 219

쿨징코정⁸⁰_{밀리그램}

(은행엽건조엑스)

원료약품 및 분량 1정 중

- 유효성분 : 은행엽건조엑스(생규) 80mg
- 첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색1호, 적색40호
- 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 II 녹색(85F61388), 콜로이드성아산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨

성상

녹색의 원형 필름코팅정

효능·효과

1. 주요효 효과

- 1) 말초동맥순환장애(간혈성파행증)의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성이명
- 3) 이명, 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움등의 치매성증상을 수반하는 기질 성 뇌기능장애의 치료

용법·용량

■ 성인

- 1) 말초동맥순환장애, 어지러움, 이명 : 은행엽건조엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여한다.
 - 2) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽건조엑스로서 1회 40-80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)
- 3) 임부 (동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예:펜프로쿠몬, 와파린), 항혈소판제(예:클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제))를 복용하고 있는 환자
- 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.상당시 가능한 첨부문서를 소지할 것

- 1) 수술이 예정된 자
- 2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우
- 3) 이상반응
 - ① 드물게 가려운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
 - ② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
 - ③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

저장방법

기밀용기, 실온보관(1-30℃)

사용기간

제조일로부터 36 개월

포장단위

30 정/병, 300 정/병

제조외회사

(주)시어스제약 (070-8822-7755) / 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 22, 3층일부

제조사

에이프로제약(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

판매자

(주)메디포럼제약 / 경기도 남양주시 경강로 27

※ 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오.

※ 본 의약품은 "우수의약품제조관리기준(KGMP)"에 따라 엄격하게 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 이 설명서 작성(개정)일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

작성일자 : 2020.7.23(00)