



[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 수산화마그네슘(KP) 500 mg
노회엑스(EP) 100 mg
우르소데옥시콜산(KP) 10 mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 경질무수구산, 전분글리콜산나트륨, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 탭크, 산화티탄

[성상] 흰색의 타원형 필름코팅정제

[효능·효과]

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량]

- 만15세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 3회, 식전(식간(식사때와 식사때 사이) 또는 식후)에 복용한다.
- 만11세 이상 ~ 만15세 미만 : 1회 1정, 1일 2회, 아침, 저녁 공복 세식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이)에 복용한다.
- 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회(처음 복용)는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 급성 복부질환(중수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 2) 장폐색(창자막힘) 환자
 - 3) 만 7세 이하의 어린이
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.
제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 신장장애 환자
 - 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 이 약을 복용함으로써 발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우

2) 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우

3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 500정/병

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[제조사] (주)레고켐제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 피해구제를 신청할 수 있습니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.

작성일 : 2019. 10. 22, (Rev.0)

(주)레고켐제약
LegoChemPharma