

유한 비타민씨디정

YUHAN VITAMIN C·D Tablet



개요 및 특징


비타민C는 대표적인 항산화 비타민으로 활성산소를 제거하여 세포 손상을 막는데 탁월한 효과가 있으며 피로, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 체력저하에도 중요한 역할을 합니다. 또한 비타민D는 칼슘 흡수와 뼈 건강에 매우 중요한 성분입니다. 하지만 비타민C는 체내 생성되지 않아 외부로부터 섭취가 필요하고 비타민D는 햇빛을 쬔면 체내 합성되긴 하나 야외활동이 적은 현대인에게 부족하기 쉬워 실제로 한국인 10명 중 8~9명은 비타민D가 부족합니다.

유한비타민CD정은 항산화효과가 있는 비타민C와 뼈 건강에 중요한 비타민D가 고효량(많은 함량) 함유된 영양제로 2가지 성분을 동시에 한번에 간편하게 복용할 수 있는 제품입니다. 또한 경계의 크기가 작고 표면이 매끄러워 목넘김이 편하기 때문에 쉽게 복용할 수 있습니다.

원료약품 및 분량 1정 중

- 유효성분
아스코르브산과립(97%비타민C)(별규)아스코르브산으로서 500 mg) --- 515.5 mg
녹색클레칼시페롤산(BP)(비타민D)로서 500 IU) ----- 5 mg
- 첨가제
미결정셀룰로오스, 크로스포비돈, 콜로이드성아산화규소, 스테아르산, 스테아르산마그네슘, 히프록셀로오스, 폴리에틸렌글리콜 6000, 탭크

성상 흰색의 타원형 필름코팅정



효능·효과

■ 다음 경우의 비타민 C, D의 보급·유체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하, 발육기, 노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다. • 비타민C(아스코르브산과립 97%) : 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방 • 비타민D(녹색클레칼시페롤산) : 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방

용법·용량

만 8세 이상 및 성인: 1회 1정, 1일 1~2회 복용합니다. ※ 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오



※ 그림과 같이 정제포장의 뒷부분을 화살표 방향으로 누르고 알약만 꺼내 복용합니다
이때, 실수로 알루미늄 포장층 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 명종 질환), 신장(콩팥)질환 환자
2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과 과민반응이 있는 환자
3) 만 3개월 미만의 영아
4) 신장(콩팥)결석 환자
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 만 1세 미만의 영아
2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
4) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
6) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
7) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사
2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
3) 우발적으로 과량복용 한 경우
4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
3) 각종 요검사에 해당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

사용기한 외부포장에 표기

※ 블리스터 포장의 제조번호 / 사용기한 표시 방법은 아래와 같습니다. 예) 제조번호: #20001, 사용기한 2022년 1월 6일인 경우 → "20001/220106"로 표시

포장단위 120정, 240정

※ 습기가 많은 곳에서는 보관 중 인습(흡습)되어 변색될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다. ※ 이 제품은 정부의 "소비자분쟁해결기준"에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. ※ 이 첨부문서의 작성연월일 이후 변경내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국 의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일: 2019년 10월 30일



제조판매자

유한양행

본사: 서울특별시 동대문구 노량진로 74
중앙: 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지 219

홈페이지: www.yuhan.co.kr | 소비자상담실: 080-024-1188(수신자 요금부담)