

전문약품 | KGMP적격업체

SekarisonTM SR Tab. (Eperisone HCl)

- 원료약품의 분량 : 1정 중
유효성분: 에페리손염산염(KP)..... 75 mg
첨가제(동결유래성분): 스테아르산이그네슘(S, 우지)
기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 시트르산수화물, 오파드라이틴셀(03B28796), 전분글리콜산나트륨, 클로이드성아산화규소, 히프로멜로오스

- 성상
흰색 내지 거의 흰색의 원형 서방성 필름코팅정

- 효능·효과
근골격계 질환에 수반하는 운동성 근육연축: 경관완중추근, 견관절주위염, 요통

- 용법·용량
이 약은 서방성 정제이므로 분쇄하거나 분할 또는 씹지 않고 전체를 복용한다.
성인: 1일 2회, 1회 1정(에페리손염산염으로서 75mg) 식후 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 이 약에 과민증 환자
 - 중증의 근무력증 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 약물과민증의 병력이 있는 환자
 - 간장에 현재간기능을 악화시킬 수 있다
- 이상반응
 - 에페리손염산염 일반정에서 보고된 이상반응
1) 속 및 마니 팔목시양 반응: 드물게 속 및 마니 팔목시양 반응을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 증상에: 발적, 가려움, 두드러기, 부종, 호흡곤란 등)이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
2) 중독성표피괴사증(리델증후군) 및 피부점막안증후군(스타벤스-존슨 증후군): 에페리손염산염은 중독성표피괴사증 사용 및 피부점막안증후군 등 심각한 피부 이상을 유발할 수 있기 때문에, 발열, 홍반, 물집, 가려움, 안구 충혈, 구내염 등의 증상이 나타나는지 잘 관찰하여야 하고, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 다른 이상반응

	페페로(0.1~5%미만)	드물게(0.1%미만)	빈도불명
간장 ¹⁾		ALT, AST, ALP 상승	
신장 ¹⁾		단백뇨, BUN의 상승	
혈액 ¹⁾		빈혈	
과민증 ²⁾	발진	가려움	다형성출혈성 홍반
정신신경계	불면, 졸음, 두통, 사지마비	몸의 굳어짐, 사지마비	
소화기계	구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 구갈, 변비, 설사, 복통	복부팽만감, 구내염	
비뇨기계		요배, 요실금, 잔뇨감	
전신증상	무력감, 비틀거림, 전신편태감	어지러움, 근긴장저하	
기타	안면홍조	발한, 부종, 기슴두근거림	말꼭질

¹⁾ 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
²⁾ 이러한 증상이 나타나는 경우 투여를 중지한다.

3.2 에페리손염산염 서방정의 임상반응

금성 요통을 동반한 근골격계 근육연축 증상이 있는 환자를 대상으로 한 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조, 평행군 임상시험(n=239)에서, 총 12명에서 이상반응이 발생하였고, 발현율은 시험군(서방정)에서 5.26% (6/114명, 6건), 대조군(일반정)은 4.84% (6/124명, 6건)로 조사되었다. 시험군과 대조군 모두에서 중대한 이상반응은 보고되지 않았다. 임상약과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상약물반응 발현율을 분석한 결과, 시험군은 1.75% (2/114명, 2건), 대조군은 0.81% (1/124명, 1건)로 조사되었다. 2% 이상의 발현빈도를 나타낸 이상반응은 어지러움(2.63%) 뿐이었다. 임상시험 중 이 약 투여 및 대조군에서 보고된 이상반응을 발현기관별로 나열하면 다음과 같다.

	시험군(n=114) 에페리손염산염 서방정			대조군(n=124) 에페리손염산염 일반정		
	n	발현율 (%)	발현건수 n	n	발현율 (%)	발현건수 n
신경계 장애	3	(2.63)	3	2	(1.61)	2
어지러움	3	(2.63)	3	0	(0.00)	0
두통	0	(0.00)	0	1	(0.81)	1
졸음	0	(0.00)	0	1	(0.81)	1

소화기계	2	(1.75)	2	1	(0.81)	1
소화불량	1	(0.88)	1	1	(0.81)	1
설사	1	(0.88)	1	0	(0.00)	0
감염 및 침입	0	(0.00)	0	2	(1.61)	2
비인두염	0	(0.00)	0	1	(0.81)	1
상기도 감염	0	(0.00)	0	1	(0.81)	1
일반장애 및 투여부위 상태	1	(0.88)	1	0	(0.00)	0
국소부종	1	(0.88)	1	0	(0.00)	0
손상, 중독, 절차상 합병증	0	(0.00)	0	1	(0.81)	1
인대 염좌	0	(0.00)	0	1	(0.81)	1

3.3 국내 시판 후 수집된 중대한 이상사례 분석: 평가 결과 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
• 면역계: 아니팔릭사스반응

4. 일반적 주의

- 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로, 이러한 경우에는 강령 또는 투여를 중지한다.
- 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5. 상호작용

이 약의 유사작용인 임신중페리손과 메토카르바미올 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단 되는 경우에만 투여한다.

2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

9. 전문가를 위한 정보

1) 약리작용

에페리손염산염은 중추성 근이완제로 근신경계 질환 환자에서 근육 경련이나 경직 상태의 치료에 사용된다.

2) 약동학적 정보

(1) 속방제제와 약동학적 특성비교

건강한 성인 남성 25명을 대상으로 이 약 75 mg을 1일 2회 1정씩 및 에페리손염산염 속방제제 50mg을 1일 3회 1정씩 투여 후 약동학적 자료를 비교 평가한 결과(2×2 교차시험), 에페리손의 로그변환한 AUC₀₋₂₄와 C_{max}의 구간(시험약/대조약) 비율의 점추정치는 각각 0.80, 0.72 이었고, T_{max}는 2.92시간으로 속방제제에 비해 지연되었다.

나. 반박투여

건강한 성인 남성 25명을 대상으로 이 약 75 mg을 1일 2회 1정씩, 에페리손염산염 속방제제 50mg을 1일 3회 1정씩을 각각 5일간 식후 반박투여 하고 항정상태에서의 약동학적 자료를 비교 평가한 결과(2×2 교차시험), 에페리손의 로그변환한 AUC₀₋₂₄와 C_{max}의 구간(시험약/대조약) 비율의 점추정치는 각각 0.85, 0.79 이었고, T_{max}는 2.84시간으로 속방제제에 비해 지연되었다.

(2) 식이영양 평가

건강한 성인 남성 27명을 대상으로 이 약 75mg을 1일 1회 공복 및 고지방식후 단회 투여하여 약동학적 자료를 비교 평가한 결과(2×2 교차시험), 공복 시 경구투여에 대한 고지방식이 후 경구투여시 에페리손의 AUC₀₋₂₄와 C_{max}의 구간(식후 투여군/공복 투여군) 비율의 점추정치는 각각 0.97, 1.11 이었고, T_{max}의 경우 3.3시간으로 공복시에 비해 증가하였다.

3) 임상시험 정보

금성 요통 환자 238명을 대상으로 한 다기관, 무작위배정, 이중 눈가림, 평행 임상시험에서 에페리손염산염 서방정 75mg 1일 2회 경구투여는 에페리손염산염 속방정 50mg 1일 3회 경구투여와 비교하여 베이스라인 대비 7일째 FFDF(Finger-to-floor distance)의 변화로 평가되는 근육이완효과에 대하여 시험군이 대조군에 비해 비열등함을 입증하였다.

- 저장방법: 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

- 포장단위: 30정/병, 500정/병

- 제조원: 삼진제약(주) - 경기도 화성시 향남읍 제막공단 1길 52(제조의뢰자)
아주약품(주) - 경기도 평택시 신남로 121번길 23(제조사)

※ 의사·약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 청부문서 문안 개정일자(2019년 11월 11일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)