

안전한 염증완화제

트리플라정

■ 원료약품 및 그 분량: 1정(293 mg) 중

· 유효성분: 브로멜라인(20,000브로멜라인단위)(KP) - 40.0mg

결정트립신(2,500USP트립신단위)(USP) - 1.0mg

· 동물유래성분: 유당수화물/소/우유

· 기타 첨가제: 옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스, 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 이산화규소, 스테아르산마그네슘, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스, 산화티탄

■ 성상: 흰색의 원형 필름코팅정

■ 효능·효과

다음 질환 및 증상의 염증성 부종(부기)의 완화: 수술 및 외상(상처)후, 유즙울체(젖고임)

■ 용법·용량

성인: 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다.

체내에서의 작용기간은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 혈액응고이상 환자

2) 심한 간장애 또는 신장애(신장장애) 환자

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.)

4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용(함께 복용(사용))투여에 의해, 항응고제의 작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 과민반응: 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2) 소화기계: 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.

3) 혈액계: 드물게 코피, 혈액가래 등의 출혈 경향이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.

■ 저장방법: 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

■ 사용기간: 제조일로부터 36개월

■ 포장단위: 10정/PTP

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약품을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품은 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 최종승인일자(2024년 02월 19일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 "의약품 검색" 또는 문의(☎02-574-2541)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용피해구제신청: 한국의약품안전관리원(☎1644-6223)

■ 제조자: 정우신약(주) 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

2403-01



정우신약(주)