

원료약품 및 그 분량 1정 중

• 유효성분: 아시클로버(USP)..... 200mg

- 첨가제(동물유래): 유당수화물(간강한 소의 우유)
- 첨가제(타르색소): 청색 1호
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스 스테아르산마그네슘 옥수수전분 전분글리콜산나트륨

성상 연한 파란색의 원형 정제

한글, 한글

1. 초발성 및 재발성 생식기포진을 포함한 피부 및 점막조직의 단순포진 바이러스 감염증의 치료 및 예방
2. 대상포진 바이러스 감염증의 치료, 특히 급성시의 통증에 효과가 있다. 반면 포진후 신경통에 대한 효과는 아직 증명되지 않았다.
3. 2세 이상 소아의 수두 치료

양평 · 양평

- 성인
1. 단순포진바이러스 감염증의 치료
- 1) 아시클로비로서 1일 5회, 1회 200 mg씩 4시간 간격으로 5일간 투여하며, 중증 초발성 감염증인 경우 치료를 연장할 수 있다.
- 2) 중증 면역기능저하 환자(골수이식후 등)는 소화관 흡수장애 환자는 1회 투여량을 400 mg까지 증량하거나 정맥주사로 투여경로를 바꿀 수 있다.
- 3) 간질 흡 취(화) 병리 투여하는 것이 중요. 재발성이 경우 정중증상이나 발병이 원은 1도나 때 투여하는 것이 바람직하다.

2. 면역기능이 정상인 환자의 단순포진 감염증의 예방
- 1) 이 약으로서 1일 4회 1회 200 mg을 약 6시간 간격으로 투여한다. 또는 1일 2회, 1회 400 mg씩 12시간 간격으로 투여할 수도 있다.
 - 2) 그 후 1일 2회씩 1일 2 ~ 3회로 감량하여 그 유효성을 확인한 후 감량할 수도 있다.
 - 3) 질환의 지역성인 변화과정은 환자에게 위해서, 장기치료를 하는 경우 1 ~ 2개월간 주 2회로 치료를 중단하여 회복에 보아야 한다.

3. 면역기능이 저하된 환자의 단순포진 감염증의 예방
 - 1) 이 약으로서 1일 4회, 1회 200 mg씩 약 6시간 간격으로 투여한다.
 - 2) 중증 면역기능저하 환자(골수이식 후 등) 또는 소화기관 흡수장애 환자에는 1회 투여량을 400 mg까지 증량하거나 정맥주사로 투여경로를 바꿀 수 있다.
 - 3) 간염의 위험이 있는 환자 투여한다.

4. 대상포진 감염증의 치료
 - 1) 이 약으로서 1일 5회, 1회 800 mg씩 취침시간을 제외하고 약 4시간 간격으로 투여하며, 총 7일간 투여한다.
 - 2) 중증 면역기능低下 환자 또는 소화기관 흡수장애 환자는 정맥주사로 투여하는 것을 고려해야 한다.
 - 3) 감염 후 최대한 빨리 투여하는 것이 좋으며, 빨리 치료할수록 더 좋은 효과가 나타난다.

1. 단산포진 감염증의 치료 및 면역기능이 저하된 환자의 단산포진 감염증의 예방
- 1) 2세 이상 : 성인에 준함.
 - 2) 2세 미만 : 성인용량의 1/2을 투여함.
 - 3) 면역기능정상 환자의 단산포진 바이러스 감염증의 예방에 대한 확실한 자료는 아직 없다.
2. 2세 이상 소아의 소듐치르 : 이 약으로서 1회 제초 40단 20 mg/회 최대 800 mg/일 1회 4회 5회가 투여된다.

- 신장액에 환자
 - 신장에 환자는 정신신경계 이상증상이 나타나고 가끔씩 두통과 구역증은 경험한다. 2시간 이하에 투여한다.

1. 단순포진 감염증의 치료
경구 용량은 정맥주사로 인한 독작용보다 높지 않는 것이 보통이다. 그러나 중증 신장에 환자(크레아티닌 청소율이 분당 10 mL 미만)는 이 용량(12.5~12.5 mg)보다 20% 감소된 용량에 제한을 받는다.

- 2) 대장포진 바이러스 감염증의 치료
- 1) 크레티닌 청소율이 분당 10 mL 미만인 환자는 이 약으로서 1회 800 mg 1일 2회, 약 12시간 간격으로 감량 투여하는 것이 바람직하다.
- 2) 크레티닌 청소율이 분당 10 ~ 25 mL인 환자는 이 약으로서 1회 800 mg 1일 3회, 약 8시간 간격으로 감량 투여하는 것이 바람직하다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 발라시클로바에 대한 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 신장에 환자(정신신경계의 이상반응이 나타나기 쉽다)
- 2) 간장에 환자(간기능이 더 악화되기 쉽다)
- 3) 영유아
- 4) 고령자

- 1) 쇼크 : 돌출계 아나필락시스 쇼크, 아나필락시스모양 반응이 나타나는 경우가 있으므로 충분히 관찰하고, 혈압강화, 호흡관리, 흉부압박 등의 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 2) 과민반응 : 광과민반응, 고창약이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 때때로 발진, 발열, 수포, 두드러기모양 홍반, 두드러기가 나타날 수 있다.
- 3) 피부 : 탈모증, 다형홍반, 피부점막만성홍종(스피븐스-존슨 증후군), 중증성표피괴사증후군(리엘증후군)이 나타날 수 있다.
- 4) 정신신경계 : 의식장애, 방향감각장애, 집중력장애, 공격적인 행동, 이인증(擬人症), 초조, 조화운동불능, 혼수, 착각, 섬망, 말더듬, 노병증, 착상, 정신병, 경련, 졸음, 떨림, 흥분, 긴장, 불안, 불만, 혼탁함, 이상간기, 운동실조, 보행불능, 불수의 운동, 안구진탕, 두통계 떨림, 졸음, 어지러움이 나타날 수 있으며, 이러한 증상은 고령자나 신장장애에서 더 자주 나타난다.
- 5) 심장 : 심박전, 결절조, 때때로 BUN, 혈청크레아티닌 상승, 두통계 혈뇨, 단백뇨, 요중 적혈구원주, 뇨노가 나타날 수 있다.
- 6) 혈액 및 림프계 : 백혈구과혈관형, 림프절병증, 출혈, 자반, 때때로 빈혈, 백혈구 감소 또는 증가, 호산구 증가, 두통계 림프구 증가, 혈소판 감소, 과립구 감소, 혈소판 감소, 호염기구 증가가 나타날 수 있다.
- 7) 간장 : 간염, 간장애, 황달, 때때로 간기능 검사치의 상승(AST/ALT, LDH, ALP, 총 빌리루빈 상승), 간비대가 나타날 수 있다.
- 8) 소화기계 : 위염, 목막음, 변비, 급성췌장염, 때때로 설사, 무른변, 상복부통, 위통, 복통, 구역, 구토, 두통계 소화불량, 식욕부진, 혀염이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 9) 전신 : 발열, 말단부종, 실신, 창백, 근력저하, 무력감, 때때로 전신관대감, 두통이 나타날 수 있다.
- 10) 근육골격계 : 관절통, 근육통이 나타날 수 있다.
- 11) 순환기계 : 부정맥, 가슴통증, 혈압상승, 혈압저하, 빈맥, 두통계 심계항진이 나타날 수 있다.
- 12) 비뇨기계 : 요폐색, 두통계 배뇨관염이 나타날 수 있다.
- 13) 기타 : 오장, 폐렴, 인두염, 호흡관리, 흉수, 통풍, 난창, 결막염, 시각이상, 미각장애, 탈모, 발한, 저나트륨혈증, 혈청단백저하, 때때로 총콜레스테롤치, 트리글리세리드치, 혈청칼슘치의 상승, 두통계 혈청알부민치 저하가 나타날 수 있다.

- 4) 일반적 주의
 - 1) 단순포진과 수두는 5일간, 대상포진은 7일간 투여 후에도 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우에는 다른 치료방법으로 바꾸어야 한다.
 - 2) 이 약은 가능한 한 병명 초기에 투여하는 것이 가장 효과적이므로, 대상포진의 치료는 피부증상이 나타난 후 5일 이내에, 수두의 치료는 피부증상이 나타난 후 3일 이내에 투여를 시작하여야 한다.
 - 3) 면역기능저하 환자에 대한 치료는 정맥주사제 사용을 고려해야 한다.
 - 4) 이 약 투여기간 중(특히 고용량 투여 시) 탈수증상의 예방 및 신장독성의 위험을 줄이기 위해 충분한 수분섭취가 필요하다.
 - 5) 재발성 생식기 포진 치료는 생식기 포진의 발병을 반복하는 환자(면역 능력이 있는 환자, 적어도 6회 이상 반복되는 환자)를 대상으로 하며, 또한 이 약을 1년간 투여 한 후에는 계속 투여할지 여부를 검토해야 한다.
 - 6) 의식 장애 등이 나타날 수 있으므로 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계 조작에 주의하도록 환자에게 충분히 설명한다. 또한 신장에 환자는 특히 의식 장애 등이 나타나기 쉬우므로 환자의 상태에 따라 주의해야 한다.

3. 상호작용
- 1) 프로베네티드와 이 약 주사제의 병용 시 이 약의 평균 반감기를 18 % 연장시키고 혈장-농도 곡선의 면적 40 % 증가시키며 요배출 및 신초소율을 감소시킨다는 보고가 있다.
 - 2) 신장기능에 영향을 주는 어떤 약물도 아시클로버의 약물동력학에 실질적 영향을 줄 수 있고 신독성 약물과 병용시 신장애의 위험이 증가할 수 있다.
 - 3) 시메티딘은 이 약의 요배출을 감소시킨 혈장-농도 곡선의 면적은 27 % 증가시킨다는 보고가 있다.

- 4) 지베렐린은 이 약의 효소들을 감소시켜, 발육 정도 측면의 반응을 2% 증가시킨다는 보고가 있다.
- 4) 테오필린과 이 약의 병용 시 테오필린의 중독증상이 나타날 수 있다.
- 5) 미코페놀레이트모페틸과 이 약의 병용 시 미코페놀레이트모페틸 대사물질의 배출을 감소시켜 두 약 모두의 혈장-농도 곡선의 면적을 증가시킨다는 보고가 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 동물실험결과 기형형성작용이 보고되었으므로, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 2) 이 약의 성분은 모유로 이행되므로 치료 중에는 수유를 중단한다.

7. 소아에 대한 투여
영양아 및 소아에 대해서는 필요한 최소한의 사용에 그치는 등 신중히 투여한다. 특히 신생아, 저체중출생아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

8. 고령자에 대한 투여
 이 약은 주로 신장기능에 배설되는데, 고령자는 신기능이 저하된 경우가 많아 높은 혈중농도가 지속될 위험이 있고 이상반응이 발현하기 쉬우므로, 용량 및 투여간격에 유의하여 신중히 투여한다. 또한 투여 시 충분한 수분을 공급한다.

- 1) 이 약을 한번에 20 g을 복용한 예에서 과량투여 시의 이상반응으로는 초조, 혼수, 경련, 기면이 보고되었다. 과량투여 시 이 약이 신세뇨관에 침전되어 BUN/Cr 상승 및 신부전증을 일으킬 수 있으며, 과량 정맥투여 시 치관, 환관, 흉관, 뇌전증발작

- 2) 과량투여 시 환자의 상태를 주의깊게 관찰하면서 이 약의 혈중농도를 측정해야 하며, 과량투여증상이 나타나는 경우에는 이 약의 혈중농도를 낮추기 위해 혈액투석을 고려할 수 있다.

- 가. 시험과 신질아시클로바제(아시클로바제[신질제약(株)]과 대조약 동아조비라실정200밀리그램[아시클로바제(동아에스티(株))]을 2×2 교차시험으로 각 1실적 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구 투여하여 26명의 혈중 아시클로바제를 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그 변환하여 통계 처리하였을 때, AUC와 C_{max} 는 평균치 차의 90%신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25를 벗어났다. 다만, AUC와 C_{max} 의 평균치 차의 log 0.9에서 log 1.1 이나이고, 제출된 비교용출시험자료가 동등하므로 의약품동등성시험기준 제17조제3항의 단서항에 따라 생략하고 동등성을 인정하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-12hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	동아조비락스정200밀리그램(아시클로버) [동아에스티(주)]	2576±947	570.9±232.7	1.75 (1.00~2.50)	3.40±0.52
시험약	신일아시클로버정(아시클로버) [신일제약㈜]	2268±589	503.3±173.8	1.50 (0.50~4.00)	3.62±0.86
90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)		log 0.7979~ 1.0312	log 0.7865~ 1.0435	—	—
로그변환한 평균치의 차		log 0.9070	log 0.9050		

(AUC, C_{max}, t_{1/2} : 평균값±표준편차, T_{max} : 중앙값(범위), n=26)

AUC : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max} : 최고혈중농도
T_{max} : 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2} : 말단 소실 반감기

* 비교평가항목을 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

- 나. 의약품동등성시험기준 제17조제3항의 단서항에 따라 제출된 시험의 신일아시를로버정(아시를로버(신일제약㈜)과 대조약 동아조비르(스정200밀리그램(동아메시트㈜)과의 비교용출시험자료는 대조약과 용출양상이 동등하였다.

11. 기타

- 1) 골수소핵시험에서 고용량(180 mg/kg 이상)을 마우스 복강내 투여 시 염색체 이상이 유발될 수 있다는 보고가 있었다.
- 2) 최근의 몇몇 연구결과에서 이 약은 고용량 투여 시 돌연변이 및 정자형성감소를 유발하는 것으로 나타났다. 그러나, 추천용량 범위의 사람에게 몇몇 연구에서는 정자개수에 영향을 주지 않았다.

- 저장방법 기밀용기, 25℃이하 건조보관
포장단위 30정/병, 100정/병
제조사 신일제약㈜ 충청북도 충주시 양성면 복상골길 28

- 반작을 피우기에 신경 : 한국의약품안전관리원(1644 6223, 14 3330)
- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용(복용)하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
- 반드시 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

- 물베는 사용법을 모르고나 의약품이 없는 경우 반드시 의사·약사와 상담 후 사용하십시오.
- 본 제품의 품질관리 문의사항은 080-581-5800으로, 기타 제품관련 문의사항은 (02)714-0091로 연락하시기 바랍니다.
- 만약 구입시 사용(유효)기한이 지나거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국·개설자 및 의약품 판매업자에게만 교환하여 드립니다.

- 최신의 제초를 책임질 시향에 따라 고강제된 전용연구(전화 080 719 2000)를 운영하고 있습니다.
- 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서 작성년월일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.kuhnsbiopharm.com)에서 확인할 수 있습니다.
- 의약품 용어해설 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(www.nedrug.mfds.go.kr)을 참조하시기 바랍니다.

- 제조의리자 **김영배의 출판** 작성년월일: 2022.05.20
206413(뒤)

- 건물마이오름(주)**
충남 천안시 서북구 작산읍 거리막길 33 제일동