

■ ■ ■ 의약품은 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

일반의약품

파비시드정 PHARVICID^{Tab.}

위통·속쓰림 치료에~

【원료약품 및 분량】 1정 중

유효성분 : 건조수산화알루미늄겔(KP)	200mg
침강탄산칼슘(KP)	100mg
탄산마그네슘(KP)	50mg
탄산수소나트륨(KP)	50mg

기타첨가제 : 히드록시프로필셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 경질무수규산, 툴코, 스테아르산마그네슘

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부(상복부)팽만감, 체함, 구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인: 1회 2정, 1일 3회
만 8세 이상 15세 미만: 1회 1정, 1일 3회
식간(식사때와 식사때 사이) 및 취침시 복용한다.
복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
(1) 투석요법을 받고 있는 환자 (2) 만 7세 이하의 어린이
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
(1) 테트라사이클린계 항생제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
(1) 신장장애 환자 (2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
(1) 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 경우
(2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
(2) 어린이 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여할 것.
(3) 나트륨 제한 식이를 하는 사람.
- 저장상의 주의사항
(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
(3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10T(10T/ PTP), 20T(10T/ PTP×2), 240T((10T/PTP×12)×2)

※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharvis.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223) ※ 소비자상담실 : 02)579-6262

본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성일자: PVCT 2019.10.24 (I-191024)

제조사
PHARVIS (주) 한국파비스제약
KOREA 경기도 안산시 단원구 신단로 83번길 127