

간장질환완제

전문의약품

제품정보 QR코드



가네듀오캡슐

이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 약과 함께 보관하십시오.

【조성·성상】

1. 원료약품의 분량 1캡슐 중 유효성분 : 비페닐디메틸디카르복실레이트혼합물(별규) 125.0mg (비페닐디메틸디카르복실레이트로서 12.5mg), 우르소데옥시콜산(JP) 50.0mg, 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 유당수화물, 캡슐(상, 하 흰색) **2. 성상** : 흰색의 가루를 함유한 상하부 흰색의 경질캡슐제

【효능·효과】

지속적으로 SGPT가 상승되어 있는 만성지속성 간염

【용법·용량】

보통 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후 경구 투여합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오. 1) 완전담도 폐쇄가 있는 환자 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다. **2. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.** 1) 만성 활동성 간염환자 2) 간경화 환자 3) 저칼륨혈증이 있는 환자 4) 심한 체장 질환이 있는 환자 5) 소화성 궤양이 있는 환자 6) 담석증 환자 **3. 부작용** 1) 소화기 : 때때로 설사, 구역, 구토, 드

물게 복통, 변비, 가슴앓이, 위부불쾌감 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 2) 과민증 : 때때로 기력증증, 드물게 발진 등의 과민증상이 나타날 수 있습니다. 간혹 파진이 생길 수 있으나 일반적으로 항과민약을 함께 사용하면 소실됩니다. 3) 일과성 황달이 나타날 수 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용 투여하면 소실됩니다. 4) 기타 : 드물게 전신관통감, 현기가 나타날 수 있습니다. 5) 국내 시판 후 조사결과 : 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 640명의 만성지속성간염환자를 대상으로 실시한 시판 후 사용성적조사결과 유해사례 및 약물유해반응 발현율은 0.31%(2명/640명, 3건)로 보고되었으며, 간경화, 복수, 급성 C형 간염 각각 0.16%(1명/640명, 1건)로 조사되었습니다. 모두 중대하고 예상하지 못한 약물유해반응이며, 이 약과의 인과관계를 배제할 수 없었습니다. **4. 일반적 주의사항** 1) 정해진 용법 용량을 지켜십시오. 2) 장기간(최대8주)의 복용에도 불구하고 증상의 개선이 없거나, 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의하십시오. 3) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. **5. 임신부에 대한 투여** 동물실험에서 태자독성이 보고되어 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않는 것이 바람직합니다. **6. 상호작용** 경구 당뇨병약(톨부타미드 등)과 병용 투여 시 경구 당뇨병약의 작용이 증가될 수 있으므로 신중히 투여하십시오.

【저장방법】

말폐용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

【포장단위】

30캡슐/병, 90캡슐/병, 300캡슐/병

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오. 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다. KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품 101

제조의회사 :



중 군 당



제조사 : (주)파마킹

충청북도 음성군 감곡면 행군이길 87-17

충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-43

소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담)

※ 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국약물관리안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

이 첨부문서 작성일자(2023.01.09)이후 변경된 내용은 중군당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.