



활성비타민이 함유된 종합영양제

브이타민Q[®]

일반의약품 | 분류번호: 319

【유효성분】1정 중

벤포티아민(티아민염산염)으로서 36.15mg(KP).....	50.0mg	산화아연(아연)으로서 15mg(KP).....	18.7mg
리보플라빈(KP).....	50.0mg	적당용아스코르빈산97%(아스코르빈산)으로서 97mg(별규).....	100mg
니코틴산아미드(KP).....	50.0mg	시아노코발라민 1000배산(시아노코발라민)으로서 50μg(KP).....	50.0mg
판토텐산칼슘(KP).....	50.0mg	우르소데옥시콜산(KP).....	10.0mg
피리독신염산염(KP).....	50.0mg	토코페롤아세테이트 2배산(비타민E로서 10IU)(KP).....	20.0mg
폴산(KP).....	0.2mg	셀레늄함유건조효모(셀레늄으로서 13.5μg)(KP).....	25.0mg
콜린타르타르산염(USP).....	50.0mg	에르고칼시페롤과립(비타민D로서 50IU)(별규).....	0.059mg
아노시톨(KP).....	50.0mg	푸르실타민(KP).....	5.0mg
d-비오틴(USP).....	0.25mg		

· 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물:소, 사용부위:우유)

· 첨가제(타르색소): 적색40호, 청색1호알루미늄레이크, 황색5호알루미늄레이크

· 기타첨가제: 경질용구산수, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산 나트륨, 크로스비타민, 탭코, 폴리메틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

【성상】 갈색의 장방형 필름코팅형

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민(D, E, B₁, B₂, B₆, C)의 보급

- 육체피로 - 임신 · 수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하

- 발육기 - 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

· 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

· 각기 · 눈의피로

○ 아연의 보급

【용법·용량】 만 8세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1~2정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자

(2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

(3) 만 12개월 미만의 젖먹이

(4) 신장(콩팥)결석 환자

(5) 심한 증상의 신부전 환자

(6) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(Galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp Lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구약(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

(3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 만 1세 미만의 젖먹이 (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이

(4) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)

(5) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다

(6) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자

(7) 심장·순환기계기능 장애 환자

(8) 신장(콩팥)장애 환자

(9) 저단백혈증 환자

(10) 감성배당체를 투여 중인 환자

(11) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자

(12) 신장결석 병력이 있는 환자

(13) 이 약은 황색5호(선팅제로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 뉘은변, 구내염(입안염), 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 피부염, 몸 · 호흡기 약취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 폐부종(부기)

(2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 많이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

(3) 야스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

(4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

(5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.

(6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.

(7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

(8) 대량투여로 인해 구토, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 출혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

(9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

(10) 황달도스데르제, 트리검데렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

(11) 우발적으로 과량복용 한 경우

(12) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

(2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.

(3) 각종 요검사에서 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

(4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

(5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.

(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [사용기간] 제조일로부터 36개월 [포장단위] 60정/병, 120정(60정/병×2)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만일 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 문헌은 (2019년 11월 14일)작성되었으며 이후로 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품정보는 미래제약 홈페이지 또는 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 소비자상담실: 02-521-2308 / www.miraepharmkorea.co.kr

Rev.01

판매자: **경보제약** **종근당물품** 기록회사

제조자: **미래제약** 경기도 안성시 공단2로 104