

일반의약품 조제용

브로엘장용정
(브로멜라인)

500정



에이치엘비제약

【원료약품 및 그 분량】 1정 중 ■유효성분 : 브로멜라인(별규)(500(FIP단위)(으)로서) ...100mg
■첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유) ■첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색2호, 황색5호 ■기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아로신마그네슘, 폴로이드성인산화규소, 크로스포비돈, 탑실드 분홍색 39P407, 탑실드 흰색 11W401 【성상】 분홍색의 원형 장용성 필름코팅정 【효능·효과】 부종(부기)을 동반한 연중 증상의 완화, 외상(상처) 또는 수술 후의 부종(부기) 【용법·용량】 ① 성인 및 12세 이상의 소아 : 브로멜라인으로서 1회 100mg, 1일 2회 복용한다. 식사 30분 전에 물과 함께 복용한다. 체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다. 【사용상의 주의사항】 1, 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 심한 혈액응고이상 환자(예 : 혈우병) 2) 심한 간 또는 심한 신질환(신장질환) 환자(혈액투석환자 등) 3) 항응고제 또는 혈소판응집억제제를 투여중인 환자(병용투여에 의해 이들 약물의 작용이 증가되어 출혈경향이 증대될 수 있다.) 4) 임부 및 수유부(안전성이 확립되어 있지 않다.) 5) 12세 미만의 소아 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2, 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 항생제(테트라사이클린 등)를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해 항생제의 작용이 증가될 수 있다.) 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 3, 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지 중지 하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 과민반응 : 이 약에 의해 드물게 과민반응이 나타날 수 있으며, 복용 중단 시 자연적으로 빠르게 소실된다. 2) 소화기계 : 드물게 위통, 설사가 나타날 수 있다. 4, 저장상의 주의사항 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오염(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것. 【저장방법】 기밀용기, 25℃ 이하 보관 【포장단위】 500정/병

■의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오. ■본 의약품은 KGP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다. ■본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다. ■의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://ndrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오. ■기타 자세한 사항이나 문서의 작성(개정)일자(2023.07.23)이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-558-7575)로 문의하시기 바랍니다. ■의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(0644-6223, 14-3330)

【제조원】 에이치엘비제약(주) / 경기도 남양주시 경강로 27
【제조지】 (주)노바임헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

제조번호
사용기한

35x18mm



8806473047014

HL-2507-01