

조인트맥스 프리믹스



【원료약품 및 그 분량】1정 중

유효성분 :

콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	500mg
벤토티아민(KP)(티아민염산염으로서 32.5mg)	45mg
비스벤티아민(KP)(티아민염산염으로서 4.4mg)	5mg
시아노코발라민1000배산(KP)(시아노코발라민으로서 50μg)	50mg
피리독신염산염(KP)	25mg
판토텐산칼슘(KP)	25mg
감마오리자놀(KP)	5mg
산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 60.3mg)	100mg
산화아연(KP)(아연으로서 24.1mg)	30mg
콜린타르타르산염(USP)	50mg
콜레칼시페롤과립(별규)(비타민D로서 1000IU)	10mg
시트르산칼슘수화물(USP)(칼슘으로서 10.5mg)	50mg

첨가제 : 경질우수규산, 미정정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이200브라운(200F265005), 크로스카멜로오스나트륨, 폴리메탈글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

【효능·효과】

1. 다음경우의 비타민 D, B₁, B₆의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력지지원 - 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
- 각기·눈의피로

2. 아연의 보급

【용법·용량】만 8세 이상 어린이 및 보통 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

(1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 젖먹이 (4) 신장(콩팥)결석 환자 (5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

(1) 인신연, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 만 1세 미만의 젖먹이 (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (3) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이 (4) 입부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 (5) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. (6) 심장·순환기계기능 장애 환자 (6) 신장(콩팥)장애 환자 (7) 저단백혈증 환자 (8) 강심배양제를 투여 중인 환자 (9) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자 (10) 입부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 변비, 붉은 변, 저혈압, 얼굴발아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 위장관장애, 소화장애, 성부부통증, 폐부종 (2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능저 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. (4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(붓기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (5) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다. (6) 항암스테로이드, 테트라데렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (7) 우발적으로 과량복용 한 경우 (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것. (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것. (3) 오염(절토 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【성상】진한 갈색의 타원형 필름코팅정

【사용기한】제조일로부터 36개월

【포장단위】60정/병, 120정/상자(60정/병x2)

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다.

* 의약품은 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

* 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

* 자세한 사항은 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.

* 부작용파해구제신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

【판매원】GC녹십자

경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
TEL 031)290-9300

【제조원】한중제약

전라북도 완주군 봉동읍 원주산업6로 301 1~3층,
5층, 봉동로 705