

위장관 운동기능 조절제

위메부틴 150밀리그램 (트리메부틴말레산염)

Trimebutine Maleate 150.0mg

일반 의약품

분류번호:02390

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

- 유효성분: 트리메부틴말레산염(KP) 150.0mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유), 젤라틴(소, 가축)
- 기타 첨가제: 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘

■ 성 상 : 흰색의 원형 정제

■ 효능 · 효과

1. 주효능 · 효과

- 1) 식도역류 및 열공(구멍, 틈새)헤르니아(탈장), 위 · 십이지장염, 위 · 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통(배아픔), 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아질환: 습관성 구토, 비감염성 장관(창자)통과장애(변비, 설사), 동요(안절부절)자극, 수면장애

■ 용법 · 용량

성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다(먹는다, 복용한다). 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름), 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.
- 5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

2. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

3. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

4. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

■ 저장방법: 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

■ 포장단위: 10정/PTP, 90정(10정/PTP×9), 180정(90정(10정/PTP×9)×2)

■ 제조자: (주)넥스팜코리아 / 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 의약품을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서는 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품 검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하셔야 합니다.

개정연월일: 2019년 12월 09일

101 - 120919

■ 제조회 및 판매: 경보제약 종근당홀딩스 가족회사

본사·공장: 충청남도 아산시 실목로 174
서울사무소: 서울특별시 서대문구 충정로 8
소비자상담실: 02-365-2312