

프리미엄 고향량 항산화비타민을 한번에!

바스힐

Nas-Heal Cap. 캡슐

KGMP 일반의약품

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 토코페롤아세테이트(KP).....250mg(VitE로서 250IU)
아스코르빈산(KP).....250mg(VitC로서 250mg)
폴산(KP).....0.25mg
셀레늄합유건조효모(KP).....7.5mg(셀레늄으로서 15µg)
- 첨가제(타르색소):황색5호
- 기타첨가제 : 농글리세린, 레시틴, 캡슐, 콩기름, 황납, 히프로멜로오스

[성상]

노란색 액체가 충전된 주황색의 띠로 접착시킨 상하부 투명한 경질캡슐제

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 C, E의 보급
 - 육체피로
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 비타민C(아스코르빈산) : 햇빛 · 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈·비출혈(코피) 예방
 - 비타민E(토코페롤아세테이트) : 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)

[용법·용량]

만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회 2정 복용 또는 1일 2회, 1회 1정 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 영아
 - 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
 - 5) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 6) 신장장애 환자
 - 7) 저단백혈증 환자
 - 8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
 - 9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 혈장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 10) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 설사, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조골증
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
 - 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 각종 요검사에 해당의 검출을 방해할 수 있다.
 - 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것.
 - 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에는 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법]

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위]

90캡슐/병

[고객문의]

080-640-0088

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변태, 오염 또는 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 곳을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 자세한 의약품 정보는 의약품안전나라 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)의 '의약품등 검색' 란을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부 문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

최종개정연월일 : 2020.01.06

[일부공정위탁제조(제조사)]

한국콜마(주)
세종특별자치시 전의면 산단길 245

[일부공정위탁제조(제조의회사)]

클마파마(주)
충북 제천시 바이오밸리 2로 93