

가스부틴정 100mg

(트리메부틴말레산염)

기타의 소화기관용약

500정/병 조제용

제 조 (주) 케이에스제약
판매원 전남 화순군 화순읍 산단길 126

※ 의약품 사용하기 전에 아래 내용을 주의 깊게 읽으시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중 ■ 유효성분: 트리메부틴말레산염(KP) 100mg

■ 첨가제(동물성유래성분): 유당수화물(소, 우유) ■ 기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 흰색의 원형 정제 [효능·효과] 1. 주효능 효과 1) 식도역류 및 열공헤르니아(통새 탈장), 위 십이지장염, 위 십이지장궤양에 있어서의 소화기능 이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토) 2) 과민성 대장증후군 및 경련성 결장 3) 소아질환: 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요자극(안절부절), 수면장애 [용법·용량] 성인: 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여(복용)한다. 연령, 증상 등에 따라 적절히 증감한다. [사용상의 주의사항] 1. 다음환자에는 투여하지 마십시오. 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 부작용 1) 소화기계: 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름증), 구내마비감 등이 나타날 수 있다. 2) 순환기계: 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다. 3) 정신신경계: 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다. 4) 간장: 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다. 5) 과민증: 드물게 발진등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다. 3. 임부에 대한 투여: 임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. 4. 수유부에 대한 투여: 수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여 시는 수유를 중지한다. 5. 보관 및 취급상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 (뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다. 3) 오남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 [포장단위] 30정/병, 100정/병, 500정/병

※ 이 표기사항 작성(개정)일 이후 변경된 내용은 다음에서 확인하실 수 있습니다.

* 식약처 온라인의약품서관(<https://nedrug.mfds.go.kr>)

* 소비자 상담실: 061-371-0074

표기사항 작성(개정)년월일: 2019년 12월 18일 Ver.00

일반의약품 분류번호: 239



제조
번호
사용
기한

40 × 20