

생리통에 순하게 잘 맞는

KGMP적격업체 | 일반의약품

게보린[®]소프트

안전용기 · 포장

생리통 | 요통 | 근육통 연질캡슐

GEWORIN[®] Soft (Soft Capsule)

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

유효성분 : 이부프로펜(IP) 250mg
파마부름(USP) 25mg

첨가제(타르색소) : 적색3호, 적색40호

기타 첨가제 : 부틸히드록시톨루엔, 소르비톨소르비탄 액, 수산화칼륨, 숙신산젤라틴, 정제수, 폴리에틸렌글리콜600

■ 성상 : 무색의 투명한 액이 든 분홍색의 투명한 타원형 연질캡슐

■ 효능 · 효과

1. 두통, 치통, 발치후 동통(통증), 인후(목구멍)통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통(어깨 결림), 타박통, 골절통, 염좌통(뱀통증), 월경통(생리통), 외상통의 진통,
2. 오한출고 떨리는 증상, 발열시의 해열

■ 용법 · 용량

만 11세 이상 및 성인 : 1일 1~3회, 1회 1캡슐
공복(빈 속)을 피하여 복용한다.
복용간격은 4시간 이상으로 한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 출혈이 유발될 수 있다.
- 2) 심혈관계 위험 : 조절되지 않는 고혈압, 울혈심부전증(NYHA II-III), 확립된 허혈성 심장질환, 말초동맥질환, 뇌혈관질환을 가진 환자들은 신중히 고려하여 이부프로펜을 사용하여야하며 고용량 이부프로펜(1일 2400mg) 사용을 피해야 한다. 또한 심혈관계 위험 요소(예, 고혈압, 고지혈증, 당뇨병, 흡연)를 가지고 있는 환자가 고용량 이부프로펜(1일 2400mg)이 필요한 경우 장기간 치료를 시작하기 전에 신중히 고려해야한다. 임상연구 결과 고용량(1일 2400mg) 이부프로펜 사용이 동맥 혈전 형성 증상(심근경색증 또는 뇌졸중)에 대한 위험성을 다소 증가시킬 수 있다고 나타났다. 종합적으로 역학연구 결과 저용량 이부프로펜(예, 1일 1200 mg 이하)과 동맥 혈전 증상의 위험성 증가간의 연관성은 증명되지 않았다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 해열진통제, 감기약, 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 유발하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것)
- 2) 만 3 개월 이상 만 1세 미만의 영아(갓난아기)는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 바람직하다.
- 3) 분인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 5) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 6) 고령자(노인)
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드 제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 9) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 10) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람

- 11) 심근경색이나 뇌졸중 예방목적으로 저용량 아스피린을 복용하는 사람 (이 약은 아스피린의 효과를 감소시키고, 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험을 증가시킬 수 있다.) 실제실적 자료에서 이부프로펜과 아스피린(아세틸살리실산) 병용투여시 이부프로펜이 저용량 아스피린의 혈소판 응집 효과를 억제할 수 있다고 나타났다. 이 데이터 외삽법에 대해 임상적으로 불확실성이 존재하지만 일반적 또는 장기간 이부프로펜 사용시, 저용량 아스피린의 심장 보호 효과가 감소될 수 있다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역 · 구토, 식욕부진, 변비, 위통, 소화관출혈, 위부불쾌감, 어지러움, 부종(부기)
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우
 - ① 아니필락시스(과민성쇼크) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - ② 피부점막만증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사증후군(리델증후군) : 고열을 동반하고, 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈 점막에 나타날 수 있다.
 - ③ 천식
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 4) 광민감 반응(빈도불명), 빈도불명의 호신구 증가 및 전신 증후군을 동반한 약물 발진(DRESS 증후군)이 나타날 수 있다.
- 5) 이 약의 과량 복용 시 대사산증이 나타날 수 있다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 복용시에는 음주하지 말 것.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.


■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

■ 제조원 : 코스맥스바이오(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 (제조사) 삼진제약(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단길 52 (제조의뢰자)

■ 포장단위 : 12캡슐

* 게보린[®]소프트연질캡슐은 어린이 약물사고를 방지하기 위하여 "어린이 안전포장"을 하였습니다.
복용 전 아래 개봉방법을 꼭 읽으십시오.

* 개봉방법



포장 앞면을 **강하게** 눌러 약을 꺼냅니다.

* 주의

1. 충분한 양의 물과 함께 복용하십시오.
2. 의사 · 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
3. 이 제품의 포장은 어린이들이 쉽게 개봉하기 어려운 어린이 보호용 포장(hard push)을 사용하여 약의 잘못 사용, 남용 및 어린이 약물 중독을 예방하고 있습니다.
4. PTP 포장을 개봉하여 복용 시 가품 캡슐에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니, 복용 시 캡슐에 포장물이 있는지 꼭 확인하십시오.
5. 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

* 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

* 본 첨부문서 문인 개정일자(2020년 1월 8일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.samjinpharm.co.kr) 또는 소비자상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

* 부작용 피해구제신청을 한국의약품 안전관리원에서 할 수 있습니다.



판 매 원
삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 외우로 121 (서교동)
공 정 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단길 52
☎ : 본사(0231-40-0700, 공장(031) 353-1712/6