



베포산정 10밀리그람 (베포타스틴베실산염)

[원료약품의 분량] 1정 중

- 유효성분: 베포타스틴베실산염(JP)···10mg
- 기타첨가제: D-만니톨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파이드라이 흰색 03B28796, 크로스보비돈, 폴리메틸렌글리콜6000

[성상] 흰색의 원형 필름코팅정제

[효능·효과] 다년성 알레르기성 비염, 만성 두드러기, 피부질환에 수반된 소양증(습진,피부염, 피부소양증, 양진)

[용법·용량]

통상, 성인에게는 베포타스틴베실산염으로서 1회 10mg을 1일 2회 경구투여한다. 또한 연령, 증상에 따라 적절하게 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것

이 약 성분에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것

- 신기능장애가 있는 환자
- 간기능장애가 있는 환자
- 고령인 환자

3. 이상반응

임상시험에서 총 중례 1,446명 중, 부작용이 137명(9.5%) 보고되었다

- 정신신경계 : 졸음, 권태감, 두통, 두중감, 현기증
- 소화기계 : 구갈, 구내건조, 설염, 오심, 구도, 위통, 위부불쾌감, 설사
- 혈액계 : 백혈구수 변동, 호산구과다증
- 간장 : AST(GOT), ALT(GPT), r-GTP, LDH, 총빌리루빈 상승
- 신장 : 뇨단백, 뇨당, 뇨잠혈, 뇨우로빌리노겐
- 피부 : 발진, 종창의 과민반응


국내 시판 후 조사 결과(정제) 국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 3,717명의 환자를 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과 유해사례 발현율은 인과관계와 상관없이 1.8%(68명/3,717명, 80건)로 보고되었다. 졸음 1.26%(47명/3,717명, 47건), 갈증 0.30%(11명/3,717명, 11건), 복부불쾌 0.27%(10명/3,717명, 10건), 권태 0.11%(4명/3,717명, 4건), 얼굴부종 0.05% (2명/3,717명, 2건), SGOT 상승, SGPT 상승, 두통, 두근거림, 얼굴홍조, 쓴맛 각 0.03%(1명/3,717명, 1건)순으로 조사되었다. 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 유해 사례인 약물유해반응 발현율은 1.4%(52명/3,717명, 62건)로 보고되었다. 졸음 1.13%(42명/3,717명, 42건), 갈증 0.24%(9명/3,717명, 9건), 복부불쾌 0.11%(4명/3,717명, 4건), 권태 0.08%(3명/3,717명, 3건), 얼굴홍조, SGOT 상승, SGPT 상승 각각 0.03%(1명/3,717명, 1건)이었다. 국내 시판 후 조사기간 동안 발생한 예상하지 못한 유해사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 0.13%(5명/3,717명, 5건)이었으며, 얼굴부종 0.05%(2명/3,717명, 2건), 두근거림, 얼굴홍조, 쓴맛 각각 0.03%(1명/3,717명, 1건)로 보고되었다. 이 중 이 약과 인과관계를 배제할 수 없는 유해사례인 약물유해반응으로 얼굴홍조 1건이 보고되었다. 국내 시판 후 조사기간 동안 발생한 중대한 유해사례는 보고되지 않았다.

4. 일반적 주의

- 졸음을 유발할 수 있으므로, 본제 투여중의 환자에게는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작등에 대해 주의시켜야 한다.
- 장기간스테로이드요법을 받고 있던 환자로, 본제를 투여함에 따라 스테로이드제를 감량할 경우에는 충분한 관리하에서 서서히 한다.
- 신장애헤환자에서 이약의 혈중농도를 상승시킬 수 있다. 또한 높은 혈중농도가 지속될 우려가 있으므로 저용량(각, 1회량 5밀리그람)부터 투여하는 등, 신중히 투여하고, 이상 이 관찰되는 경우에는 감량, 휴약등의 적절한 처치가 필요하다.
- 본제는 계절성 알러지성 비염환자에 대하여 연구되지 않은바 주의하여 사용하여야 하며, 투여하는 경우에는 호발하는 계절을 고려하여 그 직전부터 투여를 개시하고, 호발하는 계절 종료시까지 계속하는 것이 바람직하다.
- 본제의 사용에 의해 효과가 확인되지 않는 경우에는 장기간 투여하지 않는다.

5. 상호작용

베포산정 10밀리그람 (베포타스틴베실산염)



전문의약품

분류번호:141

다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여하지 않는다.

6. 임부, 산부, 수유부에 대한 투여

- 임신중 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으며, 또한 동물실험에서 태아로 이행됨이 발견되고 있으므로, 임부 또는 임신 가능성이 있는 부인에게는 투여하지 않는 것이 바람직하지만, 투여하지 않을 수 없는 경우에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 동물실험(랫)에서 모유 중으로 이행된다는 보고가 있으므로, 수유중인 부인에게는 투여하지 않는 것이 바람직하지만, 부득이하게 본제를 투여할 경우에는 수유를 피하도록 한다.

7. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

8. 고령자에 대한 투여

본제는 주로 신장으로 배설되며, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 높은 혈중농도가 지속될 위험이 있어 본제를 고령자에게 사용할 경우 주의하여 투여한다.

9. 임상검사치에의 영향

이 약은 알레르겐 피내반응을 억제하여 알레르겐 확인에 지장을 줄 수 있으므로 피내반응 검사 실시전에 이 약을 투약하지 않는 것이 바람직하다.

10. 적응상의 주의

약제 교수시, PTP포장의 약제는 PTP시트에서 꺼내어 복용하도록 지도한다. (PTP시트를 잘못 삼켜서, 딱딱하고 뾰족한 부분이 식도 점막을 자극하여, 심각한 경우, 천공을 일으켜 종격동염 등의 중대한 합병증을 일으킨 예가 보고되고 있다.)

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 습기를 피하여 30℃ 이하에서 보관한다.

12. 의약품동등성시험 정보^{※1}

가. 시험약 베타스틴정10밀리그람(베포타스틴베실산염)(풍림무약(주))과 대조약 타리온정10밀리그람(베포타스틴베실산염)(동아에스티(주))을 2x2 교차시험으로 각각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 단회 경구투여하여 25명의 혈중 베포타스틴을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUCt, Cmax)를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log0.8에서 log1.25 이내로써 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	타리온정10밀리그람 (베포타스틴베실산염) (동아에스티(주))	325.0±44.6	78.74±16.01	1.00(0.67-1.67)	3.26±0.33
시험약	베타스틴정10밀리그람 (베포타스틴베실산염) (풍림무약(주))	331.9±48.9	77.92±16.93	1.00(0.67-3.00)	3.22±0.43
90% 신뢰구간 [*] (기준: log0.8 ~ log1.25)		log 0.9867~ log 1.0533	log 0.9238~ log 1.0477	-	-
(AUC _t , C _{max} , t _{1/2} / 평균값 ± 표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n=25)					
AUC: 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 말단 소실 반감기 [*] 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간					

주) 1 이 약은 풍림무약(주) 베타스틴정10밀리그람(베포타스틴베실산염)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전공정을 풍림무약(주)에 위탁 제조하였음.

[저장방법 및 사용기간] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 / 제조일로부터 36 개월

[포장단위] 30정/병, 300정/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.

※ 이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은(02)588-0941에서 확인할 수 있습니다.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(의약품이상사례보고)에 알려주시기바랍니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다. (부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(전화 : 1644-6223))

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라 의약품통합정보시스템(http://nedrug.mfds.go.kr)을 참조하십시오.

최종개정일자 : 2024. 09. 09

[제조사]

 **풍림무약주식회사**

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120

[제조의뢰자, 판매원]

 **NIELSON 한국넬슨제약(주)**

충북 음성군 금왕읍 금일로 271-8

» 접지 시

베포산정 10밀리그람 (베포타스틴베실산염)



Total
Printing

성신문화사 **북라벨·메뉴얼·이중라벨 전문**

서울시 중구 마린대로 2길 17 성신빌딩 TEL 02-2263-0621

www. booklabel.co.kr | www.북라벨.com

업체명	한국넬슨제약(풍림무약)
제품명	베포산정
규격	138×175mm
인쇄도수	양면 먹 1도 ■
원단사양	캠퍼스지 50g
단수/접지규격	4×5 단 / 35×35mm
서체	6pt (본문 6pt 이상)
폴림방향	좌측(머리)폴림
버전번호	2024.09.09
작성자	권유나 사원(2024.11.06)

- 재질 및 색상, 수량 확인해주세요.
- 전화번호, 주소 등 중요내용 반드시 확인해주세요.
- 빠진글자, 틀린글자, 위치 확인해주세요.
- 같은 데이터라 할지라도 인쇄할 때마다 색상차이가 날 수 있습니다.
- 색상이 진하고(+5~10%) 흐림 정도(-5%~10%)로는 재작업이 될 수 없습니다. 예를 들면 지난번에는 조금 진하게 인쇄되고 이번에는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10%~20%정도로 고객님의게서 생각하신 것과 다를 수 있습니다.

※ **상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다.**

정확한 검토 부탁드립니다.

※ **최종파일 전 시안확인을 원칙으로 하며, 고객님의 시안 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 완성된 제품은 당사에 책임이 없음을 고지합니다.**