

유미오틴정

모발 · 손발톱
성장장애 개선

※ 의약품을 사용하기 전에 다음 문서를 주의 깊게 읽고, 반드시 의약품과 함께 보관하세요.

[원료약품 및 그분량] 1정(120mg) 중

- 유효성분 : 비오틴(USP) 5.0mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소/우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드알실리콘디옥사이드, 스테아르산마그네슘

[성상] 흰색의 원형정제

[효능·효과] 비오틴 결핍으로 인한 손·발톱 또는 모발 성장장애

[용법·용량] 1일 1회 1정, 식사 전 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 이약 및 이약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아(기타)
- 3) 이약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

- 1) 날계란 흰자와 비오틴이 비가역적이며 효가 없는 복합체를 형성하므로 날계란과 비오틴을 동시에 복용(사용)하지 않는다.

3. 다음과 같은 사람은 이약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임부, 수유부 : 임신부·수유부가 복용(사용)한 경우에 대한 임상 연구는 제시되어 있지 않다. 또한 임신, 태아의 발달 단계, 태반의 발달 및 출생 후 과정에 미치는 영향에 관한 동물 연구도 충분이 이루어지지 않았다. 지금까지 임신부 복용(사용)에 있어서의 부정적인 영향에 대하여 알려진 바는 없지만 임신 중의 복용(사용)은 신중하게 이루어져야 한다. 또한 작용물질은 모유로 분비된다.

2) 항경련제 복용(사용)환자 : 카르바마제핀, 페니토인, 페노바르비탈이 비오틴의 대사를 증가하여, 오랫동안 지속되는 항경련제 투여로 비오틴의 혈중농도 감소가 발생된다.

3) 항생제 복용(사용)환자 : 항생제의 사용은 대장에 있는 박테리아에 의해 생성되는 비오틴을 감소시킬 수 있다.

4. 다음과 같은 경우 이약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
상당 시 가능한 이첨부문서를 소지할 것

1) 두드러기, 위장장애

5. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 소아의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
- 3) 오남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30°C)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 30정(10정/PTP×3)

[제조회사] 정우신약(주)/충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

[제조자] 동성제약(주)/충청남도 아산시 둔포면 관대안길 45

[판매자] (주)유미팜/경기도 구리시 안골로 89-4, 304호(수택동)

본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드려며, 공정거래위원회의 고시 “품질불합 소비자 분쟁해결기준”에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

최종수정일자(2019년 12월 12일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 “의약품 검색” 또는 문의(☎02-574-2541)에서 확인할 수 있습니다.

판매자

☑ (주)유미팜

제조회사

☑ 정우신약(주)

제조자

☑ 동성제약주식회사