

먹는 탈모 치료제

케어모블 캡슐

[원료약품 및 분량] 이 약 1캡슐 중

■ 유효성분: 약용호모(별규).....	100.0mg
케라틴(별규).....	20.0mg
티아민질산염(KP).....	60.0mg
판토텐산칼슘(KP).....	60.0mg
L-시스틴(KP).....	20.0mg
p-아미노벤조산(USP).....	20.0mg

■ 동물유래성분: 케라틴(돼지, 발톱)

■ 첨가제(타르색소): 황색5호, 황색203호, 청색1호, 적색40호

■ 기타 첨가제: 스테아르산마그네슘, 캡슐, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈

[성 상] 연회색 가루의 내용물이 든 상부 녹색, 하부 미황색(연노랑)의 불투명한 경질캡슐제

[효능·효과]

1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진

2. 탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인: 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.

12세 이상 소아: 1회 1캡슐을 1일 1 ~ 2회 식후에 복용한다.

12세 미만은 복용하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 사람

2) 12세 미만 소아

2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

2) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 위통, 구토 등 위장관 불쾌감과 발한(땀이 남), 빈맥(빠른맥), 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 홍조

2) 두부 이외의 신체부위에서 발모현상이 나타나는 경우

3) 정해진 용법·용량대로 3 ~ 4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우

4) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 설폰아미드 제제와 동시 복용 시 주의할 것.

2) 흉터로 인한 탈모나 안드로젠 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 말 것.

3) 이 약은 당뇨병환자에 복용할 수도 있다.

4) 평균 치료 기간은 3 ~ 6개월이다.

5. 저장상의 주의사항

1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 말 것.

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

3) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 차광기밀용기, 25℃이하 보관

[포장단위] 90캡슐/상자 (10캡슐/PTP×9)

[제품문의] ㈜더유제약 080-200-5724

※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패·오염 혹은 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.

※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후 본 의약품의 최신 정보를 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

[제조(회)자] ㈜더유제약 경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-151

[제 조 자] ㈜마더스제약 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

작성(개정)연월일: 2019.10.11

M191001

Pharmaceuticals
(주)더유제약경기도 남양주시 진접읍
경복대로바람골길 42-151