

팜카딘 정 20밀리그램 (파모티딘)

【원료약품 및 분량】1정 중

- 유효성분 : 파모티딘(KP) 20mg
- 첨가제 (동물유래) : 유당수화물 (네덜란드산 소, 우유)
- 기타첨가제 : 스테아르산마그네슘, 오파드라이한셀(03F68945), 옥수수전분, 포비돈

【성 상】 흰색의 원형 필름코팅정제

【효능 · 효과】

- 주요효 효과
- 위·십이지장궤양, 문합부궤양, 상부소화관출혈 (소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성위염에 의한), 역류성식도염, 졸링거-엘리슨증후군
- 다음 질환의 위점막 병변 (미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기

【용법 · 용량】

- 위·십이지장궤양, 문합부궤양, 상부소화관출혈 (소화성궤양, 급성스트레스궤양, 출혈성궤양에 의한), 역류성식도염, 졸링거-엘리슨증후군 : 성인 파모티딘으로서 1회 20mg 1일 2회 (아침식사 후, 저녁식사 후 또는 취침 시) 경구투여하거나 또는 1회 40mg 1일 1회 (취침 시) 경구투여한다. 상부소화관 출혈의 경우에는 보통 주사제로 치료를 개시하고, 경구투여가 가능하게 된 후에는 경구투여로 바꾼다.
- 다음 질환의 위점막 병변 (미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기 성인 : 파모티딘으로서 1회 10mg 1일 2회 (아침식사 후, 저녁식사 후 또는 취침 시) 경구투여하거나 또는 1회 20mg 1일 1회 (취침 시) 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 이 약의 성분 및 다른 H2 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
- 신장에 환자 (혈중 농도가 지속되므로 투여량을 감소하거나 투여간격을 두고 사용할 것)
- 심질환 환자 (심혈관계의 부작용을 일으킬 수 있다)
- 간장애 환자 (증상이 악화될 수 있다)
- 고령자

3. 부작용

1) 중대한 부작용

- 속, 과민증 (0.1% 미만) : 속, 과민증 (호흡곤란, 전신조증, 맥관부종 (안면부종, 인두부종 등), 두드러기 등)을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 법혈구 감소, 무과립구증, 재생불량성빈혈, 용혈성빈혈 (빈도불명), 혈소판 감소 (0.1% 미만) : 법혈구 감소, 무과립구증, 재생불량성빈혈, 용혈성빈혈, 혈소판 감소 (초기증상으로 전신권태감, 무력, 피하·점막출혈, 발열 등)이 나타날 수 있으므로 정기적으로 혈액검사를 실시하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 스티븐스-존슨증후군 (피부점막만증후군), 리델증후군 (중독성표피괴사증) (빈도불명) : 스티븐스-존슨증후군 (피부점막만증후군), 리델증후군 (중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 한다.
- 간기능 장애, 황달 (빈도불명) : AST (GOT)·ALT (GPT) 등의 상승, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 황문공통증 (빈도불명) : 황문공통증증이 나타날 수 있으므로 고칼륨혈증, 미오글로빈뇨, 혈청 중 근육효소의 현저한 상승, 근육통 등이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- QT 연장, 심실빈박 (토르사드 드 포인츠를 포함), 심실세동 (빈도불명) : QT 연장, 심실빈박 (토르사드 드 포인츠를 포함), 심실세동이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 특히 심질환 (심근경색, 판막증, 심근증 등)이 있는 환자에서 나타나기 쉬우므로, 투여후 환자의 상태에 주의한다.
- 의식장애, 경련 (빈도불명) : 의식장애, 전진경련 (강직성, 간대성, 근간대성)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 특히, 신기능 장애가 있는 환자에서 나타나기 쉬우므로 주의한다.
- 간질성 신염, 급성 신부전 (빈도불명) : 간질성 신염, 급성 신부전이 나타날 수 있으므로, 초기증상으로 발열, 피진, 신기능 검사치 이상 (BUN·크레아티닌 상승 등) 등이 인정되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 간질성 폐렴 (빈도불명) : 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 코티코스테로이드를 병용투여하는 등 적절한 처치를 한다.
- 부전수축 (0.1% 미만) : 다른 H₂ 수용체 길항제에서 부전수축이 나타난다는 보고가 있다.

2) 기타

	0.1~5% 미만	0.1% 미만	빈도불명
과민증		발진·피진·두드러기(종반), 안면부종	
혈액	백혈구감소	호산구증가	
소화기계	변비	설사·면역 구강·구역·구도 복부팽만·식욕부진·구개염 등	
순환기계		혈압상승·연조증·이명	서맥·빈맥·방실조동
호흡기계		기관지경련	
간장	AST(GOT)·ALT(GPT)·ALP의 상승	총빌리루빈·LDH의 상승 등	간기능이상, 황달, 경련

	0.1~5% 미만	0.1% 미만	빈도불명
정신신경계		전신근대긴 무력감, 두통, 졸음, 불안, 환각, 초조, 흥분, 상복부팽만, 구역이상, 두통감	7차성 혼돈상태, 우울, 경련, 의식장애, 어지럼증
내분비계		혈당불순, 여성형유방	
기타		관절통	CK(CKP)상승, 이상맥박, 근육경련

이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

4. 일반적 주의

- 1) 치료시 경과를 충분히 관찰하여, 증상에 따라 치료상 필요최소량을 사용하며, 이 약으로 효과가 나타나지 않는 경우에는 다른 요법으로 바꾼다. 또한 혈액상, 간기능, 신기능 등에 주의한다.
- 2) 이 약은 구강내에서 분해되지만, 구강점막에서 흡수되지 않으므로 타액 또는 물로 삼킨다.
- 3) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용할 경우 탄산칼슘 흡수 손실 위험이 발생할 수 있다.

5. 상호작용

약품명	임상증상·처치방법	기전·위험인자
아졸계 항진균약 이트라코나졸	이트라코나졸의 혈중 농도가 저하된다.	이 약의 위산분비 억제작용이 이트라코나졸의 경구흡수를 저하시킨다.

6. 고령자에 대한 투여

고령자는 이 약을 감량 또는 투여간격을 연장하는 등 신중히 투여한다(주로 신장으로 배설되지만, 고령자에게는 신기능이 저하되어 있는 수가 많아 혈중 농도가 유지될 우려가 있다.).

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임부에 대한 투여
임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다(임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.).
- 2) 수유부에 대한 투여
모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유부는 수유를 중단한다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다. (사용경험이 적다.)

9. 의약품동등성시험 정보^{*)}

시험약 삼익파모티딘정 (파모티딘) (삼익제약(주)) 과 대조약 동아가스터정20밀리그램 (파모티딘) (동아에스티(주)) 을 2×2교차시험으로 각 1정 씹어 건강한 성인에게 공복시 단회 경구투여하여 혈중파모티딘을 측정하고, 24명의 비교평가항목치 (AUC₀₋₂₄, C_{max})를 로그변환하여 통계 처리 하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25이내로서 생물학적으로 동등함을 입증 하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-24h} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	동아가스터정 20밀리그램 (동아에스티(주))	481.7 ± 110.8	70.44 ± 25.52	3.00(1.00 ~ 6.00)	4.6 ± 0.90
시험약	삼익파모티딘정 (파모티딘) (삼익제약(주))	498.0 ± 116.1	69.61 ± 15.63	3.00(1.500 ~ 4.00)	4.7 ± 0.70
90% 신뢰구간* (기준: log 0.8 ~ log 1.25)		log 0.9666 ~ log 1.1042	log 0.9395 ~ log 1.0871		

(AUC, C_{max}, t_{1/2}: 평균값 ± 표준편차, T_{max}: 중앙값(범위), n = 24)

AUC: 투약시간부터 최종혈중농도 측정시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max}: 최고혈중농도
T_{max}: 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2}: 말단 소실 반감기
*) 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90% 신뢰구간

*) 이 약은 삼익제약 (주) 삼익파모티딘정 (파모티딘) 과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 삼익제약 (주) 에 위탁 제조하였음.

10. 기타

이 약의 투여로 위염에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 약성이 아닌 것을 확인한 후에 투여한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관 (1~30℃) 보관

【포장정보】 30정/병, 500정/병, 1000정/병

【제조자】 삼익제약 (주) / 인천광역시 부평구 청안로 13

【제조외의사】 (주) 시어스제약 (070-8822-7755)

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명 6로 22 3층일부

【판매자】 (주) 에이프로젠H&G / 경기도 화성시 양감면 두머리길 18

- ※ 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오.
- ※ 본 의약품은 "우수의약품제조관리기준 (KGMP)"에 따라 엄격하게 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 의약품을 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.
- ※ 사용 (유효) 기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 이 설명서 작성 (개정) 일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)