

알레스잘 정

(레보세티리진염산염)

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 레보세티리진염산염(염기).....5mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 글로이드성이산화규소, 폴리에틸렌글리콜400, 히프르멜로오스

[성상] 흰색 또는 미황색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

다음 질환의 증상 완화

1. 계절성 알레르기성 비염 또는 다년성 알레르기성 비염(지속적 알레르기성 비염 포함)
2. 만성 특발성 두드러기
3. 가려움증을 동반한 피부병 및 습진(하이드로코르티손 외용제와 병용)

[용법·용량]

성인 및 6세 이상의 소아 식사에 상관없이 1회 1정(레보세티리진염산염으로써 5mg), 1일 1회 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다. 신장에 환자는 신장기능(크리아티닌 청소율(Cl_{cr} (ml/min))에 따라 용량을 조절한다.

크리아티닌 청소율(Cl_{cr} (ml/min))	용량 및 횟수
경증	$50 \leq Cl_{cr} < 80$ 1회 1정, 1일 1회
중등증	$30 \leq Cl_{cr} < 50$ 1회 1정, 2일 1회
중증	$10 \leq Cl_{cr} < 30$ 1회 1정, 3일 1회

[사용상의주의사항]

1. 다음환자에는 투여하지 말 것

- 1) 약 성분 및 히드록시진 또는 피페라진염도체에 대해 과민증이 있는 환자 및 그 병력이 있는 환자
- 2) 신부전 환자($Cl_{cr} < 10$ ml/min), 혈액투석을 받고 있는 환자
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 4) 1세 미만의 영아에게 이 약을 투여해서는 안되며, 6세 미만의 유아에게는 정제가 아닌 액제를 투여할 것.
- 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency), 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등 유전적인 문제가 있는 환자에게 투여해서는 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 신장애환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
- 2) 간장애환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
- 3) 고령자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)

3. 이상반응

- 1) 정신신경계: 졸음, 때때로 권태감, 두통, 비만감, 드물게 기면과 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 두중감, 흥분이 나타날 수 있다.
- 2) 소화기계: 때때로 구갈, 구순건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌, 소화불량, 복통, 위통, 복부불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 구순염, 미각이상이나 나타날 수 있다.
- 3) 순환기계: 드물게 빈맥, 부정맥, 혈압상승, 때때로 심계항진이 나타날 수 있다.
- 4) 혈액계: 혈관염, 때때로 백혈구감소, 호중구감소, 임파구증가, 호산구증가, 드물게 단핵구증가, 혈소판증가, 혈소판감소가 나타날 수 있다.
- 5) 과민증: 광과민증, 아나필락시스 쇼크, 때때로 부종, 드물게 발진, 소양감, 혈관부종이 나타날 수 있다.
- 6) 눈: 드물게 시야흐림, 결막충혈, 안 운동 발작이 나타날 수 있다.
- 7) 간: 때때로 AST, ALT, ALP, 총빌리루빈의 상승이 나타날 수 있다.
- 8) 신장: 때때로 BUN 상승, 당뇨, 요침혈이 나타날 수 있다.
- 9) 기타: 인두염, 기침, 비출혈, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 흉통, 드물게 월경불순, 이명이 나타날 수 있다.
- 10) 1세 이상 6세 미만의 소아에 대한 임상시험 결과, 가장 흔하게 나타난 이상반응은 발열, 설사, 구토, 중이염이었다.
- 11) 시판 후, 공격성, 환각, 우울, 경련, 자각이상, 호흡곤란, 두드러기, 고령약물발진, 시각장애, 간염, 근육통, 체중증가, 식욕증가, 복통, 자살관념, 현기증, 설신, 진전, 미각이상, 배뇨장애, 소변고임, 부종이 추가로 보고되었다.
- 12) 국내 시판 후 조사결과

가. 국내에서 제사를 위해 4년 동안 1866명(성제:1701명, 액제:165명)의 환자를 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 유효사례의 발현율은 1.13 % (21명/1866명, 25년)이었다. 주 유효사례는 졸림 0.27% (5명/1866명), 진정 0.21% (4명/1866명), 어지러움 0.11% (2명/1866명)의 순이었다. 이 중 약과의 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반을 발현율은 0.64% (12명/1866명, 12건)으로 보고되었으며 졸림 0.27% (5명/1866명), 진정 0.21% (4명/1866명), 어지러움 0.11% (2명/1866명), 두통 0.05% (1명/1866명)의 순이었다. 중대한 유효사례는 약과의 인과관계에 상관없

이 압박골절 및 폐렴 각 0.05% (1명/1866명, 1명)이며, 예상치 못한 유효사례는 약과의 인과관계에 상관없이 구내염, 가래 이상, 후비루, 호흡곤란, 착각감, 고혈압, 압박 골절, 폐렴이 각 1건씩 보고되었다.

나. 제삼자 기간동안 자발적인 보고, 임상시험 및 문헌정보들을 통해 보고된 예상치 못한 약물유해반으로 근육통 2건, 동공확대 1건, 여드름 1건, 고혈당 1건, 두드러기 1건, 복부팽만 1건, 체중증가 1건으로 총 8건이 보고되었다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약 복용 후 졸림, 피로, 무력증이 나타날 수 있으므로 운전이나 기계조작같이 기민함을 요구하는 작업을 행할 경우 좀더 주의를 기울여야 한다.
- 2) 기민함을 감소시키거나 중추신경계 작용을 추가로 떨어뜨릴 수 있으므로 이 약과 알코올, 항우울제와 같이 복용하는 것은 피해야 한다.
- 3) 레보세티리진은 요자류의 위험을 증가시킬 수 있으므로 요자류의 선행요인(예: 착수장애, 전립선 비대)이 있는 환자에게 투여할 경우 주의하여야 한다.

5. 상호작용

- 1) 다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여 하지 않는다.
- 2) 라세미체(광학이성질체)인 세티리진의 경우에는 알코올의 영향을 증가시키지 않을 것으로 보이지만(0.5 g/L 혈액 수준), 레보세티리진과 알코올 또는 기타 CNS 억제제를 병용투여하는 경우 경계심이 추가로 감소될 수 있고 수행 장애를 야기할 수 있다.
- 3) 레보세티리진과의 상호작용을 분석한 연구는 없지만 이성체인 세티리진과의 상호작용을 분석한 연구가 있는데 안티피린, 슈도에페드린, 에리스로마이신, 아지스로마이신, 케토크나올, 시메티딘과는 상호작용이 없었다. 테오필린(1일 400mg)과의 다용량 시험에서는 세티리진 클리어런스가 경미한(16%) 감소가 보였다.
- 4) 리토나비어는 세티리진의 반감기 증가(53%) 및 클리어런스 감소(29%)와 함께 혈장 AUC를 42% 까지 증가시켰다. 리토나비어의 약물동태는 세티리진과의 병용투여로 인해 약간 변화(11%) 감소되었다.
- 5) 음식과 같이 복용 시 흡수 속도는 떨어지지만 흡수되는 총량은 감소하지 않는다.

6. 임부 및 수유부, 기임여성에 대한 투여

- 1) 동물 실험결과 기형발생이 보고된 바 있으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여하지 않는다.
- 2) 이 약 성분의 이성체인 세티리진이 모유를 통해 분비되기 때문에 이 약 성분도 모유 중에 분비될 가능성이 있으므로 수유 중에는 투여를 금하여야 한다.
- 3) 이 약은 수태능에 미치는 영향에 관한 동물시험은 실시되지 않았다.

7. 소아에 대한 투여

- 1) 12세 미만 소아에서의 권장용량은 성인 및 소아 환자에서 이 약의 전신 노출 정도와 안전성 프로파일을 비교하여 설정되었다.
- 2) 1세 미만의 영아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않는다.

8. 고령자에 대한 투여

- 1) 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에서는 혈중 농도가 상대적으로 높을 수 있으므로 사용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량하거나 휴약하고 적절한 처치를 한다.

9. 임상시험시각의 영향

- 1) 약은 알레르기 피내반응을 억제하므로 알레르기 피내반응검사를 실시하기 3-5일 전에는 이 약을 투약하지 않는 것이 바람직하다.

10. 과량투여시의 처치

- 1) 성인은 과량투여시 졸림이 나타나고 소아의 경우 초조와 안절부절이 선행된 후 졸림이 나타난다.
- 2) 이 약에 대한 특별한 해독제가 없으므로 과량투여 시 대증요법 또는 지지요법을 실시한다. 단기간 과량투여시 위 세척을 실시한다.
- 3) 이 약은 혈액투석에 의해 효과적으로 제거되지 않는다.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[포장단위] 30정/경, 300정/경

[제출문의] ㈜더유제약 080-200-5724

- ※ 본 의약품은 KGMP(의약품 제조 및 품질관리기준)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패·오염 혹은 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 의약품통합정보시스템(<https://medrug.mfds.go.kr>)을 방문하시면 첨부문서 작성(개정)일 이후 본 의약품의 최신 정보를 확인하실 수 있습니다.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 **한국의약품안전관리원에 할 수 있습니다.**

[신청방법] 1644-6223, 14-3330 | karp.drugsafe.or.kr

[신청대상] 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

[보상범위] 사망일시보상금, 장애비, 장애일시보상금, 진료비

작성(개정)연월일: 2022.07.15

M220701-2

[제조/외국제약사] ㈜더유제약 경기도 남양주시 진접읍 경복대비라골길 42-151 4~층

[제조 자] ㈜제뉴원사이언스 세종특별자치시 전의면 단단길 245



(주)더유제약

경기도 남양주시 진접읍
경복대비라골길 42-151