

일반의약품

식도역류 / 소화불량 / 과민성대장증후군으로



【원료약품 및 그 분량】 1정(300밀리그램) 중

- 유효성분: 트리메부틴말레산염(KP).....150 mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유), 젤라틴(미국 소, 가축)
- 기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 유당수화물(소, 우유), 젤라틴(미국 소, 가축), 카르복시메틸셀룰로오스칼슘

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

- 식도역류 및 열공헤르니아(틈새 탈장), 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 소아 질환: 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요(안절부절)자극, 수면장애

【용법·용량】

- 성인: 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다.
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 부작용

- 1) 소화기계: 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름), 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계: 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계: 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장: 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
- 5) 과민증: 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

2. 임부에 대한 투여

임신 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유의성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

3. 수유부에 대한 투여

수유 중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유 중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여 시는 수유를 중지한다.

4. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10정/PTP

【설명서 개정연월일 / 관리번호】 2020.01.07. / P2001-01

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 첨부문서 최종 개정연월일(2020.01.07.) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 외부 포장에 표기되어 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

【제조(외)사】  일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소비자상담실: 080-021-1010(수신자료금부담전화)
한울상담실: 02-570-3888 홈페이지: www.ilyang.co.kr

【제조사】



넥스팜코리아

【주주】 넥스팜코리아

충북 청주시 흥덕구 오송읍
오송생명4로 168-41