

레로원정 60mg

(레보드로프로핀진)

[원료약품 및 분량] 1정 중

- 유효성분 : 레보드로프로핀진(EP) -----60mg
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)
- 첨가제(기타) : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨

[성상] 흰색 원형 정제

[효능효과] 다음 질환에서의 기침 : 급·만성기관지염

[용법용량] 성인 : 레보드로프로핀진으로서 1회 60 mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여합니다. 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
 - 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
 - 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 5) 중증의 간장애 환자
 - 6) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
- 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
 - 2) 고령자
 - 3) 만 2세 미만의 영아
- 이상반응
 - 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
 - 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
 - 3) 순환기계 : 심계항진
 - 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응
 - 5) 국내 시판 후 수집된 중대한 이상사례 분석·평가 결과 확인된 사례는 다음과 같습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.
면역계 : 아나필락시스 반응
- 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있습니다.
- 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의합니다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않습니다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지 면에서 바람직하지 않으므로 주의합니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1-30℃) 보관

[포장정보] 30정/병, 300정/병

[사용기한] 제조일로부터 36개월(라벨 별도 표시일 참조)

[제조 의뢰자] (주)서흥 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

[제조자] 위더스제약(주) : 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 103

* 의약품 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원
(02-1644-6223 또는 14-3330)

* 문서번호 : 20230101-02

* 본 의약품은 KGMP(의약품제조 및 품질관리기준) 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 펼친 제품입니다. 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. * 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. * 의약품 용어설명, 의약품 허가 변경사항 등 기타 자세한 의약품 정보는 의약품 안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.
* 소비자 상담실 : 02-2210-8169