



신경 비타민을 함유한
근육경련 및 혈액순환 개선제

마그탑 파워 연질캡슐

Magtop Power Soft Cap.



[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

■ 유효성분 :	
산화마그네슘(KP)	250 mg
(마그네슘으로서 150.78 mg)	
토코페롤아세테이트(KP)	500 mg
(비타민E로서 500 IU)	
γ-오리자놀(KP)	5 mg
피리독신염산염(USP)	62 mg
티아민질산염(KP)	50 mg
■ 동물유래성분 :	숙신산젤라틴(돼지, 가축)
■ 타르색소 :	적색40호, 청색호, 황색5호
■ 기타첨가제 :	공기름, 농글리세린, 레시틴, 황납, 산화티탄, 폴리소르베이트 80

[성상] 회백색의 유상 내용물을 함유한 적갈색의 장방형 연질캡슐

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₆ 의 보급
 - 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기, 눈의피로
 - 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일2회, 1회 1캡슐 복용한다.

[사용상 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 심한 증상의 신부전 환자 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 3) 심장·순환기계기능 장애 환자 4) 신장장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 임부 7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 8) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 붉은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다. 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 7) 우발적으로 과량복용 한 경우 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것. 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관.

[사용기한] 제조일로부터 24개월

[포장단위] 60캡슐, 120캡슐

[소비자상담실] 031-8018-0364

[판매원] KyongboPharm  **종근당홀딩스** 가죽회사

[제조자] COSMAX BIO 

/ 코스맥스바이오(주) 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
※의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
※본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁 해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
※부작용 보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)
※설명서 개정일자이후 변경된 내용은 식약처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

개정일자 : 2020. 01. 20