

릴리큐

장용연질캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

유효성분 : 비사코딜(PCA)	6.00mg
우르소데옥시콜산(PCA)	12.00mg
도큐레이트나트륨(PSF)	20.00mg

참가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 황색호
 참가제(동유류) : 젤라틴(가임동물 - 돼지 사용무위 : 가축)
 기타첨가제 : 공기용, 아자강화유, 황산, 폴리크로메이트80, 소르비톨, 소르비탄엑, 벡틴, 무수인산수소나트륨, 시트르산, 산화티탄

[성상] 미향색의 유상 내용물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐

[효능 · 효과]

- 변비
- 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내비상압증, 치질

[용법 · 용량]

만 15세 이상 및 성인 : 1회 1~2캡슐씩 1일 1회 취침시(공복시) 복용한다.
 다만, 초하는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 급성 복부(배부)증(급성·만성) 장출혈, 괴양성 결장염 등) 환자
- (2) 장폐색(장자막) 환자
- (3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (4) 종 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식물)을 복용하지 말 것.

제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - (2) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - (3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - (4) 나트륨 제한시를 하고 있는 사람
 - (5) 직장암 수술 후의 병력이 있는 사람
 - (6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- (7) 이 약은 황색5호(산술용수 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당시 가능한 한 이 성분투여를 중지할 것.

- (1) 이 약을 복용함으로써 발전 · 증혈되어 보여진 가려움, 심한 복통(배아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
- (2) 이 약을 복용함으로써 복(배부)부종(붓음), 경련이 일어날 경우
- (3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것
- (2) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
- (3) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비가 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것
- (4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 장주출 지질제를 투여 후 투여하고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재하여 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- (3) 오염(물·뒹사물)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10캡슐/피티피[[10캡슐/PTP X 1], 20캡슐/피티피[[10캡슐/PTP X 2], 30캡슐/피티피[[10캡슐/PTP X 3], 60캡슐/피티피[[10캡슐/PTP X 6], 120캡슐/피티피[[10캡슐/PTP X 12]]

[제조(회)사] 아이큐어(주) / 전라북도 완주군 봉동읍 완주신당로 248

[제조자] 코스맥스파마(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부

[판매자] 보령한신우 / 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

- ※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부서류를 주의 깊게 읽어와야 하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 본 약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
 (만약, 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.)
- ※ 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 소비자 상담전화(080-700-0178) 또는 약약품안전나라 약약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr/searchDrug>)을 통해 확인 할 수 있습니다.
- ※ 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.
- ※ 부작용보고 및 피백구제신청은 한국약물관리공단(1644-6223)에서 할 수 있습니다.

LLQ-2002-00

성명서 작성(개정)연월일 : 2020. 02. 25

[제조(회)사]

iCure 아이큐어(주)

[제조자]

COSMAX PHARMA

[판매자]

BORYUNG
Consumer