

일반의약품

슬램비타정

[현료 및 그 분량] 1정 중

■ 유소산염 : 비스페타이드(비타)	33.33mg
(타이만염산염으로서 28.16mg)	
피리독스염(비타)	33.33mg
시아노코발라민(비타)	500μg
토코페롤속시(비타)	34.53mg
(토코산-α-토코페롤로서 33.33mg)	
니코틴아미드(비타)	20.00mg

■ 첨가제(타르색소) : 황색 203호

- 첨가제(물용액) : 유당수화물(기원동물) : 소, 사용부위 : 우유, 젤라틴(기원동물) : 소, 사용부위 : 가죽내파
 ■ 기타 첨가제 : 자치면도하드록시프로필셀룰로오스, 미량정셀룰로오스, 탈크, 경질무수구산, 히드록시프로필셀룰로오스, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산마그네슘, 아라비아고무, 벵글, 폴리비닐피롤리돈, 탈크, 산화티탄, 침강탄산칼슘, 폴리메틸렌글리콜6000, 리보플라빈

[성상]

노랑색의 원형 당의정

[효능 · 효과]

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(외(하)관절, 어깨관절, 오십견 등), 손발의 저림, 눈의 피로
 ■ 다음 경우의 비타민 B₆, B₁₂의 보급 : 육체노동 시 임신, 수유기, 병중, 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시

[용법 · 용량] 1회 1정 복용하십시오.

- 15세 이상 어린이 및 성인 : 1회 2~3정
 ■ 11~14세 어린이 : 1회 1~2정
 ■ 5~10세 어린이 : 1회 1정

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
- 2) 5세 미만의 어린이
- 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), 락포 유당(젖당)불내증(수용성 락타제 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음 약을 복용하지 마십시오.

레보도파

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부, 수유부

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 발진 · 발진(종) 발진이 나타나거나, 가려움
- 2) 구역 · 구토, 위부불쾌감, 식욕부진, 복부(배)부종(팽만감)
- 3) 붉은 변, 설사, 변비와 같은 증상이 지속되거나 심해질 경우

- 4) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨리거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 5) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)이나 합성 소인이 있는 환자가 비타민 B₆ 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)의 위험이 증가할 수 있습니다.
- 6) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병(neuropathy) : 말초신경 계의 기능적 장애 또는 병적변화(이) 나타날 수 있습니다.
- 7) 임신이 부족한 환자(비타민 B₆를 1일 10mg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다).
- 8) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애) 고요산혈증(hyperuricemia) : 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태, 간손상을 일으킬 수 있습니다.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 장해진 용법 - 용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 투여하십시오.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하여 복용하십시오.
- 4) 이 약을 물 또는 술로 마시지 마십시오. 물 또는 술로 마실 경우 당의가 변색할 수 있습니다.
- 5) 병 중의 폐장은 수송 중에 장제의 파손을 방지하기 위한 것이므로 개봉 후에는 필요가 없으므로 버리십시오.
- 6) 사용기간이 경과된 제품은 복용하지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여 투병을 꼭 닫아 보관하십시오.
- 3) 외팔로 사용 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기 실온(1~30℃) 보관

[포장단위] 90정

[제조회사] 에이프로젠(주) / 경기도 화성시 장안면 두마리길 16

[제조지] (주)한국비타민 / 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 127

[판매처] (주)에코시 / 서울특별시 동대문구 사기자로 203 3층 303호

※ 구입 시 사용(유효)기간이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 반품할 수 있습니다.

※ 개정일자(2020년 01월 28일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://hndrug.mfds.go.kr/>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기간이 지난 의약품은 사용하지 않습니다.

※ 소비자 상담실 (02)661-4011

※ 부작용 보고 : 한국약품 안전관리원 (1644-6223)

첨부문서 최종 개정연월일 : 2020.01.28

2001-00