

뉴먼트 엠지플러스큐

활성비타민 함유 근육경련 및
혈액순환 개선제

연질캡슐



[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,800 mg) 중

■ 유효성분 :

산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 210.48mg)	349.000 mg
토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 500IU)	500.000 mg
벤포티아민(KP)(티아민염산염으로서 18.08mg)	25.000 mg
리보플라빈(KP)	25.000 mg
유비데카레논(KP)	5.000 mg
피리독신염산염(KP)	50.000 mg
시아노코발라민(KP)	0.500 mg
감마-오리자놀(KP)	5.000 mg

■ 기타 첨가제 : 콩기름, 황납, 캐시틴, 폴리소르베이트80, 숙신산젤라틴, 농글리세린, 카카오색소, 산화티탄

[성 상] 황색의 내용물이 든 암갈색의 장방형 연질캡슐

[용법용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용한다.

[효능효과]

1. 다음 경우의 비타민 E, B1, B2, B6의 보급

- 육체피로

- 임신 · 수유기

- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하

- 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

· 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수축저림 · 수축냉증(손발이 차가움)

· 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

· 각기, 눈의 피로

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

(2) 만 12개월 미만의 젖먹이

(3) 심한 증상의 신부전 환자

(4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

(5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

(1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제

(2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자

(2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

(3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자

(4) 신장(콩팥)장애 환자

(5) 저단백혈증 환자

(6) 임부

(7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상단 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

- 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 율혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- (8) 우발적으로 과량복용한 경우
- (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것

(2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.

(3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

(4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것

(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[포장단위] 10캡슐/PTP, 60캡슐/PTP(10캡슐/PTPx6),

120캡슐/PTP(10캡슐/PTPx6)x2)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 제조일로부터 24개월

[소비자상담실] (고객만족팀) 1588-2675 / 080-090-6777(수신자 부담)

※ 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 주의해 주십시오.

※ 구입시 유효기간 또는 사용기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

설명서 작성일자 : 2022.02.15

위 일자는 설명서 작성일자로 사용기한과 관련이 없습니다.

[판매원] JW 중의제약 충청남도 당진시 송악읍 한진1길 56

[제조원] RpBio 알피 바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7