

실디나연질캡슐

(밀크시슬열매건조엑스)

SDNI-001

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중,

- 유효성분: 밀크시슬열매건조엑스(생규) 350.00mg(실리마린으로서 196mg)
- 기타첨가제: 농글리세린, 레시틴, 비결정성소르비톨액, 산화티탄, 아자경화유, 카라기난, 카카오색소, 콩기름, 폴리소르베이트 80, 황납, 히드록시프로필옥수수전분

[성상] 황갈색의 유상내용물을 함유한 암갈색의 장방형연질캡슐

[효능·효과]

다음 질환의 보조치료: 독성간질환, 만성간염, 간경변

[용법·용량]

1일 1회, 1회 1캡슐.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 심한 담도(쓸개길) 폐쇄 환자
 - 2) 이 약의 과민증 환자
 - 3) 12세 이하의 소아
 - 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 임신, 수유부
 - 2) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 1) 드물게 위통 또는 설사
 - 2) 알레르기 반응
- 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것
 - 2) 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의 할 것
 - 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[포장단위] 60캡슐/PTP [저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁 해결기준에 의거 보상 받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해드립니다.
- ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실 ☎080-777-5678: 수신자 요금 부담)로 문의주십시오.
- 제조의뢰자: 동국제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19
- 제조자: 코스맥스바이오(주) 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30

설명서 최종 개정 연월일: 2019. 12. 27