

의약품은 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

전문의약품

판토라졸정20mg

(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)

프로톤 펌프 저해제

【원료약품 및 그 분량】1정 중

- 유효성분 : 판토프라졸나트륨세스키히드레이트(USP)..... 22.55mg(판토프라졸로서 20밀리그램)
- 기타첨가제 : D-만니톨, 건조탄산나트륨, 히프도멜로오스, 크로스비돈, 푸마르산스테아릴나트륨, 탈크, 메타아크릴산-아크릴산에틸공중합체(1:1)분산액30%, 폴리에틸렌글리콜 6000, 산화티탄, 탄산수소나트륨, 라우릴황산나트륨, 크로틸렌글리콜, 포보돈, 신화제아일(황색)

【성상】노란색의 장용성 정제를 한 타원형 정제

【효능·효과】

- 경증의 위식도역류 질환 및 관련 증상(속쓰림, 신역류, 연하통)치료
- 역류성식도염의 재발방지를 위한 장기유지요법
- 지속적으로 비스테로이드소염진통제를 투여해야 하는 환자에서 비스테로이드소염진통제에 의한 위염·위십자장염의 예방

【용법·용량】

1. 경증의 역류성 식도질환 및 관련증상 치료

판토프라졸로서 1일 1회 20mg을 아침 식전 경구 투여한다. 증상경감은 일반적으로 2 ~ 4주내에 이루어지며, 통상 4주 복용으로 치유될 수 있다. 만일 치유되지 않는 경우 추가 4주 복용으로 치유될 수 있다.

2. 역류성 식도염의 재발방지를 위한 장기유지요법

판토프라졸로서 1일 1회 20mg을 아침식전 투여한다. 만일 재발한 경우 1일 판토프라졸로서 40 mg으로 증강하였다가 치유 후 다시 1일 20 mg으로 감량한다.

3. 지속적으로 비스테로이드소염진통제를 투여해야 하는 환자에서 비스테로이드소염진통제에 의한 위염·위십자장염의 예방

판토프라졸로서 1일 1회 20mg을 투여한다.

○ 고령자나 신기능장애가 있는 환자에 있어서 투여량 조정은 필요하지 않다.

○ 간장애 환자

중증의 간장애 환자에게는 이 약으로서 1일 1회 20 mg을 초과하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약, 이 약의 구성성분 또는 벤즈이미다졸류에 과민반응 및 그 병력이 있는 환자 (아나필락시스, 아나필락시스 쇼크, 혈관 부종, 기관지 경련, 급성 간질성 신장염 및 두드러기 등의 과민반응이 나타날 수 있다.)
- 2) 아타자나비르 및 넬비나비르를 투여중인 환자 (상호작용할 참조)
- 3) 임신 1기인 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 4) 수유부
- 5) 펠피비린 함유제제를 투여중인 환자 (상호작용할 참조)

2. 이상반응

1) 기관계별 이상반응

발현빈도	기관계	지주1 %~10 % 미만	매대로0.1 %~1 % 미만	드물게 0.01 %~0.1 % 미만	매우 드물게 0.01 % 미만 또는 단독보고
위장관계		상복부통, 변비, 고창 (복부 팽만감),설사	구역/구토, 트림, 입안건조		
전신계			피로, 무력증, 권태	부종(특약중단시 사라짐),체온상승(특약중단시 사라짐)	발열
간담장계			간효소치(아미노전달효소, γ-GTP) 상승	빌리루빈 상승, 간부전을 동반하거나 동반하지 않는 황달을 유발시키는 심각한 간세포 손상	
면역계				아나필락시스 쇼크를 포함하는 아나필락시스반응	
근골격계, 결합조직계				관절통, 근육통(특약중단시 사라짐)	황문근증해 혀굴절
신경계	두통		어지럼, 시각장애(시아 흐림)	미각이상	
정신계	불면		수면장애	우울증(특약중단시 사라짐), 환각, 착란, 방향감각장애	
신장 및 요로계				간질신장염	
피부 및 피하조직계		가려움증이나 피부발적과 같은 알레르기반응		두드러기, 혈관부종, 피부부식막안증후군(스티븐스-존슨 증후군), 다형성홍반, 독성 표피괴사증후(리델증후군)과 같은 심각한 피부 증상, 광각수성	
내분비계				고혈당증	
혈액 및 임파계				무과립구증	백혈구감소증, 혈소판감소증, 범혈구감소증
생식기계				여성형유방	
대사 및 영양계				고지혈증과 지질증가(트리카르세라이드, 콜레스테롤), 체중변화	저나트륨혈증, 저마그네슘혈, CK(creatinine Kinase)상승

2) 이 약의 인과관계에 상관없이 1 %이상에서 추가로 발생한 이상반응은 다음과 같다. : 불안, 관절통, 무기력증, 요통, 기관지염, 홍통, 기침증가, 소화불량, 호흡곤란, 독감증상(flu syndrome), 위장장애, 고지혈증, 간장질환, 감염, 편두통, 통풍, 인두염, 직장장애, 비염, AST 상승, 부비염, 상기도염, 빈뇨, 요로감염

3) 이 약과의 인과관계는 명확하지 않으나, 이 약 투여 후 1 % 미만에서 추가로 발생한 이상반응은 다음과 같다.

- 전신계 : 증기, 알레르기성鼻炎, 오한, 피냉, 안면부종, 일반적인 두통, 열감, 탈장, 임상실험실검사이상, 권태감, 모날리아증, 종양, 골다양성약물반응

- 심혈관계 : 심전도이상, 협심증, 부정맥, 심방세동, 관상동맥질환, 홍통, 울혈성심부전, 출혈, 고혈압, 저혈압, 심근경색, 심근허혈, 심근확장, 망막혈관질환, 실신, 빈맥, 정맥역, 혈전증, 혈관확장

- 내분비계 : 당뇨, 갑상선종

- 간 및 담도계 : 담낭통, 고빌리루빈증, 담낭염, 담석증, 황달, 간염, ALP 상승

- 혈액계 : 빈혈, 반상출혈, 호산구증가증, 혈결핍성빈혈, 백혈구증가증, 백혈구감소증, 혈소판감소증

- 소화 및 영양계 : 탈수, 통풍, 갈증, 재충증가, 재충감소

- 근골격계 : 관절염, 골절현, 관절질환, 다리경련, 혈액변형, 건조염

- 신경계 : Abnormal dream, 혼돈, 경면, 입마름, 구아장애, 환각, 활동과다, 성욕감퇴, 초조, 신경통, 신경염, 신경장애, 이상감각, 반사작용감소, 수면장애, 졸립, 이상지각, 진전

- 호흡기계 : 천식, 코피, 폐관직, 후두염, 호흡장애, 폐염, 목소리변형

- 피부/부속기계 : 여드름, 탈모증, 접촉성피부염, 습진, 균성피부염, 출혈, 단순포진, 대상포진, 모순모양피부염, 반구진성 발진, 피부피진, 피부결양, 발한

- 특수감각 : 악시, 배내장, 난청, 복시증, 이물, 마비, 녹내장, 외이도염, 미각이상, 이명

- 비뇨기계 : 일부뇨빈, 귀두염, 유방통, 방광염, 월경불순, 배뇨장애, 과루관염, 혈뇨, 발기부전, 신장결석, 신장통, 뇨증, 전립선장애, 신우신장염, 음낭부종, 요도통, 요도질환, 비뇨이상, 질염

4) 사면 후 주시에서 나타난 이상반응

- 대사 및 영양계

- 빈도 불명 : 저마그네슘혈증

- 감염

- 빈도 불명 : 글로스트리프 디피실증상 설사

다음은 프로토넨프억제제의 사면 후 주시를 통해 보고된 이상반응이다. 이 이상반응은 불특정 다수의 인구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에, 항상 발생률을 신뢰성 있게 예측하거나 약물 투여와의 인과관계를 확립할 수 있지는 않다.

- 면역계 : 전신홍반루푸스

- 피부 및 피하조직계 : 피부홍반루푸스

3. 일반적 주의

1) 이 약으로 인해 약성증상의 증상이 완화되거나 진전이 지연될 수 있으므로 약성 증상이 의심되는 경도 증상(의도하지 않은 현저한 체중 감소, 재발성 구토, 삼킴곤란, 토혈, 흑색변 등)이 있으면서 위궤양이 있거나 의심되는 경우 약성이 더욱 위험을 확인하고 투여해야 한다.

2) 이 약으로 장기간 치료할 경우(특히 1년 이상) 환자는 정기적으로 검사를 받아야 한다.

3) 중증의 간장애 환자에 대하여 투약하는 경우 1일 투여량은 20 mg을 초과하지 않는다. 또한 정기투여시 투약기간중 간효소치를 정기적으로 관찰하고 만일, 수치가 높아진 경우에는 투약을 중지한다.

4) 이 약은 신장성 위질환 같은 경미한 위증등만 징통증에는 사용되지 않는다.

5) 이 약의 장기투여로 인해 지염신증 등 무수신증에 의해 비타민 B12 결핍에서 피부홍반루푸스(Cutaneous lupus erythematosus) 증후군에 나타날 가능성이 있다.

6) 지속적으로 비스테로이드소염진통제를 복용하여 발생하는 위염·위장관 복합증에 발생하는 위염상이 증가하는 경우에는 사용을 제한하여야 한다. 위염상 증가는 65세 이상 연령이나 위궤양, 십이지장궤양 또는 위장관 출혈 등 개인적 위험성에 따라 평가한다.

7) 일부 해와 역학연구에서 프로토넨프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료와 관련된, 손목 및 척추 관절의 위험성 증가와 관련이 있을 가능성이 있다고 보고되었다. 관절의 위험은 권장용량을 상회하는 고용량을 투여한 환자와 1년 이상의 장기사용 환자에서 증가되었다.

8) 3개월 이상 프로토넨프억제제(Proton Pump Inhibitor) 치료를 받은 환자들에서 저마그네슘혈증이 드물게 보고되었으며, 1년 이상 치료받은 환자에게 가장 많이 나타났다. 대부분의 환자에게 저마그네슘혈증의 치료로서 마그네슘보충 및 프로토넨프억제제(Proton Pump Inhibitor) 투여 중단이 필요하다. 장기간 치료가 필요하거나 다량실 또는 저마그네슘혈증을 유발하는 약(예, 이뇨제)을 병용투여하는 환자들은 치료 시작을 포함한 주기적 마그네슘 수치 모니터링이 필요하다. 중대한 이상반응은 간직, 부정맥, 발작을 포함한다.

9) 프로토넨프억제제로 인해 위나 신도가 감소하면 위장장애 보통 존재하는 세균의 수가 증가한다. 이 약으로 치료할 때 살모넬라, 캄필로박터, 클로스트리도 디피실레와 같은 세균에 의한 위장관 감염 위험이 약간 증가될 수 있다. 이것은 클로스트리도 디피실레증상 설사 위험성 증가와 연관이 있으며 특히 입원환자에서 이러한 위험성이 증가되었다는 여러 관찰연구 결과가 보고되었다. 이러한 진단은 검사증가(가산되지 않았을 때 고려되어야 한다).

10) 적절한 치료 후에라도 증상이 지속되는 경우에는 추가적인 조사가 고려되어야 한다.

11) 아지티미나 시력장애같은 이상반응이 나타날 수 있으며 그러한 경우 반응하는 능력에 떨어질 수 있다.

12) 메토크세이트 : 프로토넨프억제제와 메토크세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토크세이트의 사용상의 주의사항 참조)를 병용하는 경우 메토크세이트, 그리고/또는 그 대사체의 혈청 농도가 상승 및 지속되어 메토크세이트의 독성이 나타날 수 있다는 문헌보고가 있었다. 고용량의 메토크세이트를 사용하는 경우, 프로토넨프억제제의 일시적인 투여 중단을 고려할 수 있다(상호작용할 참조).

13) 치료시 경각을 충분히 관찰하고 증상에 따라 이 약을 최소용량으로 적절한 치료기간으로 투여하여야 한다.

14) 이 약의 장기투여로 투여한 환자(특히, 헬리코박터 필로리 감염에 양성인 환자)에서 위 체부 조직감시 시 때때로 위궤양성 위염이 보고되었다.

15) 이 약을 포함한 프로토넨프억제제를 투여한 환자에서 급성 간질성 신장염이 보고되었다. 급성 간질성 신장염은 프로토넨프억제제 치료 기간 중 언제라도 발생할 수 있으며, 일반적으로 특별한 과민반응에 의해 발생한다. 급성 간질성 신장염이 발생한 경우 이 약의 투약을 중단한다.

16) 피부 및 전신홍반루푸스 : 프로토넨프억제제를 복용한 환자에서 피부홍반루푸스(Cutaneous lupus erythematosus, CLIE)와 전신홍반루푸스(Systemic lupus erythematosus, SLE)가 보고되었다. 이러한 사례들은 새로 발생한 기증의 자기면역질환의 약화로 발생하였다. 프로토넨프억제제로 유발되는 홍반루푸스 사례는 대부분 피부홍반루푸스였다. 프로토넨프억제제를 복용한 환자에서 보고된 피부홍반루푸스의 가장 흔한 형태는 아급성피부홍반루푸스이며, 일부부터 노년에 이르기까지 지속적인 약물 치료 후 수주에서 수년 이내에 발생하였다. 일반적으로 조직학적 결과는 장기침습이 없는 상태로 관찰되었다. 프로토넨프억제제를 복용한 환자에서 전신홍반루푸스는 피부홍반루푸스보다 덜 흔하게 보고되었다. 프로토넨프억제제 관련 전신홍반루푸스는 보통 비약물유발성전신홍반루푸스보다 더 가벼운 증세를 보인다. 전신홍반루푸스는 주로 젊은층의 성인부터 노년에 이르기까지 초기 약물 치료 후 수일에서 수년 이내에 발생한다. 대다수의 환자는 발진이 나타나고, 관절통과 혈구감소증으로 나타나는 것 보다 더 오랫동안 프로토넨프억제제를 투여하지 않는다. 만약 이 약을 복용한 환자에서 피부홍반루푸스 또는 전신홍반루푸스와 일치하는 증상이 나타나면, 이 약을 복용을 중단하고 적절한 전문의에게 환자 평가를 의뢰한다. 대부분의 환자들은 4 ~ 12주 내에 프로토넨프억제제 중단만을 통하여 개선되었다. 혈청학적 검사(예, 항핵항체 (Antinuclear antibody, ANA)에서 양성으로 나타날 수 있으며, 높은 혈청학적 검사결과는 양성 증상보다 해결하는데 시간이 더 소요될 수 있다.

4. 상호작용

1) 위산의 pH가 생체내이용률의 중요한 결정 요인이 되는 약물인 경우에는 이 약에 의한 위산분비억제작용 때문에 약물의 흡수가 저해될 수 있다. 다른 산 분비 억제제나 제산제와 마찬가지로 이 약의 장기투여로 투여한 환자(특히, 헬리코박터 필로리 감염에 양성인 환자)에서 위 체부 조직감시 시 때때로 위궤양성 위염이 보고되었다. 간장장애 환자에서 장기이식환자에서 이 약과 미코페놀레이트모페틸을 병용투여 시, 위내 pH의 증가로 인해 미코페놀레이트모페틸의 용해도가 감소하여 활성대사체인 미코페놀신의 노출이 감소되었다. 이 약과 미코페놀레이트모페틸을 병용투여하는 장기이식 환자에서 장기 거부반응과 미코페놀신의 감소된 노출로 인 임상의상 감시정도가 확립되지 않았다. 이 약은 미코페놀레이트모페틸을 투여 중인 환자에게는 주의하여 투여하여야 한다.

2) 이 약은 CYP-450 약물들을 통해 간에서 대사되므로, 간에서 CYP-450 효소계를 거쳐 대사하는 다른 약물과의 상호작용에 주의하여야 한다.

그러나 다음과 같은 약물들과의 유익할 만한 임상적 상호작용은 없었다. : 다이아제팜, 와르파린, 테오필린, 페니토인, 디곡신, 안티피린, 니페디딘, 페니프로카인, 디클로페낙, 카페인, 에탄올, 클리베헤나이드, 메토프롤롤, 경구용 피임제, 제산제, 나프록센, 피복시판

3) 임상적 약리학 자료에서 펠로코우몬이나 와르파린의 병용투여시의 상호작용은 없었으나, 시판 후 조사 기간 동안 INR(International Normalized Ratio)수치에 변화를 보인 몇몇의 사례가 있었다. 프로토헤나비진/INR의 증가는 비정상적 출혈, 심지어 사망까지 초래할 수 있다. 그러므로 쿠마린계 항응고제와 병용하고 있는 환자에서 판토프라졸의 사용을 개시 혹은 증진시킬 경우, 혹은 비정상적으로 프로토헤나비진/INR을 모니터링 할 것을 권장한다.

4) 간장질환 환자에서 오메프라졸(40 mg 1일 1회 투여)과 아타자나비르 300 mg/리도나비르 100 mg을 병용투여 했을 때 아타자나비르의 노출이 감소했으며(AUC, Cmax, Cmin이 약 75 % 감소), 혹은 판소프라졸(60 mg, 일회용량)과 아타자나비르 400 mg을 병용투여 했을 때 아타자나비르의 생체이용률이 상당량 감소했다. 아타자나비르의 흡수는 pH에 의하여 변한다. 그러므로 판소프라졸을 포함하는 프로토넨프억제제들은 아타자나비르 및 넬비나비르와 병용투여할 수 없다. PPI와 병용투여시 이 두 약물(아타자나비르, 넬비나비르)의 혈장농도가 감소하며 그 결과로 치료효과의 손실과 약물내성이 나타날 수 있다.

5) 간장질환 환자에서 이 약과 글로피도그렐을 병용투여시 글로피도그렐활성대사체나 글로피도그렐에 의해 유도된 펄스형억제작용에 대한 노출에 대해 임상적으로 중요한 영향은 없다.

6) 프로토넨프억제제(Proton Pump Inhibitor)를 투여중인 환자에서 tetrahydrocannabinol(THC)에 대한 소변선별검사에서 위양성평정이 있었다. 양성결과를 증명하기 위한 확실한 대체 방법은 고려되어야 할 것이다.

7) 이상반응 사례 보고, 집단약동학 연구(population pharmacokinetic studies) 및 후향적 연구 등에서 메토크세이트(주로 고용량을 사용하는 경우, 메토크세이트의 사용상의 주의사항 참조)와 프로토넨프억제제를 병용하는 경우 메토크세이트 노출이 감소되므로 임상초기 3개월간은 투여하지 않으며 그와 기간에도 지류상의 위양성이 위험성을 상화한다 고 판단되는 경우에만 투여한다.

8) 이 약과 펠피비린의 병용 시 펠피비린의 혈장농도가 감소할 수 있으므로(위장 pH 증가) 병용 투여해서는 안된다. 이는 펠피비린의 치료효과를 저하시킬 수 있다.

5. 임부 및 수유부의 투여

1) 이 약은 잇드 임약을 이용한 수태등 및 일반생식독성 시험의 고용량(450 mg/kg/day)에서 분자시험 및 출생시의 사망률 증가와 성장지연이 나타났으며 주산, 수유기 시험의 10 mg/kg/day 이상 투여군에서 출생시의 출생후 체중감소가 나타났으므로 임신초기 3개월간은 투여하지 않으며 그와 기간에도 지류상의 위양성이 위험성을 상화한다 고 판단되는 경우에만 투여한다.

2) 동물 생식연구에서는 5 mg/kg/일의 용량에서 약한 태아중독의 증상이 관찰되었다.

3) 이 약은 동물실험에서 유증으로 분비되었으며 시험에서 모유로 이행한다고 보고되었다. 따라서 수유중인 여성에게 투여하지 않는다.

6. 소아에 대한 투여 : 12세 이하의 소아에 투여경험이 제한적이므로 사용이 권장되지 않는다.

7. 과량투여시 조치 : 연제를 대상으로 한 과량투여시의 증상에 대하여는 알려진 바가 있으나 판토프라졸 240 mg을 2년간 정맥주사 하해도 이상반응은 없었다. 과량투여로 인하여 중독증상이 나타나지는 경우에는 대증요법을 실시한다.

8. 작용상의 주의사항

1) 이 약을 복용할 때는 꼭 거나 부수지 말고 그대로 복용한다.

2) 이 약은 수면간 복용하는 경우에 대한 안전성이 완전히 확립되어 있지 않으므로 역류성 식도염의 재발방지를 위한 장기용법의 경우 1년 이상 투여하려면 이익/위험비를 신중히 고려하여야 한다.

9. 보관 및 취급상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

10. 의약품동등성시험 정보^{*)}

주. 시험약 편투출정(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)(대우제약(주))과 대조약 편투출정40밀리그램(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)(한국카데타제약(주))을 2X2 교차시험으로 각 1 정씩 2시간간 실험인에게 공복 시 단회 경구투여하여 369의 혈중 판토프라졸을 측정한 결과, 대조약가항속치(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

3. 동물 생식 실험 연구에서는 5 mg/kg 이상의 용량에서 약한 태아 독성의 증상이 관찰되었다.

4. (1) 약은 동물 실험에서 유증으로 판별되었으며 사람에게서 모유로 이행된다고 보고되었다. 따라서 수유 중인 여성에게 투여하지 않는다.

5. (2) **소아에 대한 투여**: 12세 이하의 소아에 투여경험이 제한적이므로 사용이 권장되지 않는다.

6. **과량 투여 시의 처치**: 인체를 대상으로 한 과량 투여 시의 증상에 대하여는 알려진 바가 있으나 판토프라졸 240 mg을 2분간 정맥주사 하해도 이상반응은 없었다. 과량 투여로 인하여 중독 증상을 나타내는 경우에는 대증요법을 실시한다.

7. **적용상의 주의사항**

(1) 약을 복용할 때는 씹거나 부수지 말고 그대로 복용한다.

(2) 약은 수년간 복용하는 경우에 대한 안전성이 완전히 확립되어 있지 않으므로 역류성 식도염의 재발 방지를 위한 장기용법의 경우 1년 이상 투여하려면 이익/위험비를 신중히 고려하여야 한다.

8. **보관 및 취급상의 주의사항**

(1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

(2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고 원인이 되거나 품질 저하에서 배상하지 않으므로 이를 주의한다.

9. **약역동 특성상 정보**

(1) 시험약 판토프라졸(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)(대우제약(주))과 대조약 판토프라졸 40밀리그램(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)(한국카데타제약(주))을 2X2 교차 시험으로 각각 정맥강한 성인에게 공복 시 단일 경구 투여하여 36명의 혈중 판토프라졸을 측정한 결과, 비교평가항목(AUC, C_{max})을 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 차의 90% 신뢰구간 0.80에서 1.06, 1.25 이내로 사 생화학적으로 동등함을 입증하였다.

[AUC, C_{max}, t_{1/2} ; 평균값 ± 표준편차, T_{max} : 중앙값(범위), n = 36]

AUC, : 투약시간부터 최종혈중농도 정정시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적

C_{max} : 최고혈중농도

T_{max} : 최고혈중농도 도달시간

t_{1/2} : 말단 소실 반감기* 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 차의 90%신뢰구간

나. 의약품동등성시험기준 제7조제2항에 따라, 시험약 편투출정20밀리그램(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)(대우제약(주))은 대조약 편투출정(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)(대우제약(주))과의 비교용출시험지료를 제출하였으며, 대조약과 용출시험이 동등하였다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였다.

주1. 이 약은 대우제약(주) 편투출정(판토프라졸나트륨세스키히드레이트) 및 편투출정20밀리그램(판토프라졸나트륨세스키히드레이트)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 전 공정을 대우제약(주)에 위탁 제조하였음.

11. 기타

실험동물 랫트를 이용한 발암성시험(2년)에서 이 약에 기인한 위종양, 간세포선종 및 암종(50 mg/kg/day이상), 갑상선여포성 세포종양(200 mg/kg/day)병변이 관찰되었다.

【저장방법】차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【유효기간】30정/병

【포장단위】30정/병

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 nedrug.mfds.go.kr을 참조하세요.

※ 약국에서 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharvis.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약물안전전관관리원(1644-62233)

※ 소비자상담실 : 02-579-6262

본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 유효기한이 경과되었거나 변질, 변태, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성일자 : PTLT 2022.01.11

I-220111