

■■■ 의약품 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.



# 아프소겐정 AFSOGENTab.

일반의약품

파모티딘[Famotidine] 10mg

위산과다, 속쓰림, 신트림

【원료약품 및 분량】 1정 중  
유효성분 : 파모티딘(KP) ..... 10mg  
첨가제(타르색소) : 황색203호알루미늄레이크, 청색1호알루미늄레이크  
동물유래성분 : 유당수화물 (소, 우유)  
기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 흰색 85F18422

【성상】 녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 신트림

【용법·용량】 16세 이상 1회 1정(10mg), 1일 2정(20mg)까지 복용할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
  - 이 약의 성분 및 다른 H<sub>2</sub> 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자
  - 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.
  - 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈(혈액구토)이나 혈변이 있는 경우
  - 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우
  - 헉기증(어지러움) 또는 졸림, 식은땀이 함께 나타나는 경우
  - 짧은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
  - 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우
  - 예상치 않은 체중감소, 오심(구역), 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우
  - 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하고는 있는 경우
  - 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
  - 신장애(신장장애) 환자(혈중 농도가 증가될 수 있다)
  - 심질환 환자(심혈관계의 이상반응을 일으킬 수 있다)
  - 간장애 환자(증상이 악화될 수 있다)
  - 고령자(노인)
  - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.)
  - 수유부 (모유 중으로의 이행이 보고되어 있다.)
  - 다음의 약물을 복용하는 경우 : 무중치료제(이 약의 위산분비 억제작용이 아졸계 항진균(곰팡이)약(예, 이트라코나졸)의 경구흡수를 저하시킨다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
  - 증상이 지속되거나 악화되는 경우
  - 이 약은 14일 이상 복용하지 않는다.
  - 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다.
    - 과민증 : 속, 호흡곤란, 전신홍조(온몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(부기), 두드러기 등
    - 혈액 : 백혈구 감소, 적혈구 감소, 혈소판감소(지혈지연과 동일한 의미), 호산구감소, 빈혈, 지혈지연(전신권태감, 무력, 피하(피부밑)점막하 출혈, 발열)
    - 피부 : 피부점막안증후군, 표피괴사증, 발진, 두드러기(홍반)
    - 간 : 간기능 이상, AST(GOT) · ALT(GPT) 등의 상승, 총빌리루민 · LDH 상승, 황달, 간염
    - 근골격계 : 근육통, 횡문근융해증(횡문근융해), 관절통, 근육경련
    - 순환기계 : 서맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 혈압상승, 안면홍조, 이명(귀울림)
    - 정신신경계 : 의식장애, 경련, 전신권태감, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각이상, 두중감(머리무거움), 혼돈, 우울, 어지러움
    - 소화기계 : 변비, 설사, 구갈, 구역구토, 복부(배부분)팽만감, 식욕부진, 구내염(입안염)
    - 비뇨생식계 : 간질성 신염(신장염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상(BUN · 크레아티닌 상승 등), 월경불순
    - 호흡기계 : 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지경련
    - 기타 : 여성형유방, 미각이상
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
  - 이 약의 투여로 위암에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용한다.
  - 알코올이 함유된 음료와 복용하지 않도록 한다.
  - 이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담한다.
  - 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용할 경우 탄산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있다.



- 저장상의 주의사항
  - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
  - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10정/PTP, 20정(10정×2PTP)/PTP, 120정(10정×12PTP)/PTP, 240정(120정/PTP×2Box)

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.  
※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharvis.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.  
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)  
※ GC녹십자 소비자 상담실 : 080-260-0033

본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

작성일자 : AFST 2020.01.06 (I-200106)