

전문의약품

분류번호 : 기타의 혈액 및 체액응고(03990)

실로켄® 씨알정200밀리그램
CILOCHEM® CR Tabs. 200mg
(Cilostazol)



【원료약품 및 그 분량】1정 중

- 유효성분 : 실로스타졸(JP) 200mg
- 첨가제 : 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 카보머, 폴로디드이산화규소, 포비돈, 히프로멜로오스

【성성】 흰색의 장방형 서방형

【효능·효과】

1. 만성동맥폐색증(버거씨병, 폐색성 동맥경화증, 당뇨병성 말초혈관병증 등)에 따른 폐임, 동통 및 냉각 등 허혈성 재증상의 개선
2. 뇌경색(심인성뇌색전증 제외) 발증 후 재발억제

【용법·용량】

실로스타졸로서 보통 성인 1회 200mg을 1일 1회 경구투여한다.
이 약은 식사를 피하여 공복 상태에서 복용한다. (사용상 주의사항 중 '5. 일 반적 주의 6)항' 참조)

【사용상의 주의사항】

1. 경고
실로스타졸의 투여에 의해 맥박수가 증가하여 협심증이 발현하는 경우가 있으므로 협심증의 증상(흉통 등)에 대한 문진을 주의깊게 실시한다(뇌경색 재발 억제제로는 검토하는 시험에서, 장기기에 걸쳐 PRP(pressure rate product)를 의미있게 상승시키는 작용이 인정되었다. 또한, 실로스타졸의 투여군에서 협심증이 발현된 증례가 나타났다).
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 출혈(혈우병, 모세혈관 위약증, 두개내출혈, 상부소화관출혈, 요로출혈, 객혈, 초차제출혈 등) 또는 그러한 소인(활동성 소화궤양, 최근 6개월 이내에 출혈성뇌출증, 3개월 이내에 외과수술, 증식당뇨망막병증, 조절되지 않는 고혈압)이 있는 환자(출혈을 조정할 우려가 있다)
 - 2) 울혈성심부전 환자(증상을 악화시킬 우려가 있다)
 - 3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부(임부 및 수유부에 대한 투여* 항 참조)
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 항응고제(와파린 등), 항혈소판제(아스피린, 티클로피딘 등), 혈전용해제(유로키나제, 알테플라제 등), 프로스타글란딘 E 제제 및 그 유도체(알 프로스타리딜, 리마프로스트 알파엑스 등)를 투여중인 환자
 - 2) 월경기간 중인 환자(출혈을 조정할 우려가 있다)
 - 3) 관동맥 협착의 합병증 환자(이 약의 투여에 의한 맥박수 증가로 협심증을 유발할 가능성이 있다.)
 - 4) 중증 심부전 환자(크레아티닌 청소율 ≤ 25mL/분)이 약의 대사물의 혈 중농도가 상승될 수 있다.)*기타*항 참조)
 - 5) 중증도 또는 중증 간부전 환자(이 약의 혈중농도가 상승될 수 있다.)*기타*항 참조)
 - 6) 당뇨병 또는 내당능 장애가 있는 환자(출혈성 유해증상이 발현하기 쉽다.)*
 - 7) 지속적으로 혈압이 상승하고 있는 고혈압 환자(약성고혈압 등)
 - 8) 심방이나 심실전위 환자, 심방세동이나 조동 환자, 심실빈맥, 심실세동 또는 다초점성심상이상성박동 환자, QT간격의 연장이 있는 환자
 - 9) S자형 심실 중격이 있어서 위험이 있는 환자(특히 고령자)
- 4) S자형 심실 중격 환자에서 좌심실 유출로 폐쇄가 보고되었다. 실로스타졸 복용 시작 후 새로운 수축기 잡음 혹은 심장 증상의 발생 여부를 모니터링 한다.

4. 이상반응

- 이 약(실로스타졸씨알정200밀리그램)에서 수집된 정보
만성동맥폐색증 환자 99명을 대상으로 이 약을 투여한 후 보고된 이상사 레온 대부분 일반정제의 허가 사항에서 알려진 것이었다.
이 약과의 인과 관계를 배제할 수 없는 약물이상반응은 14명(14.1%)에서 18건이 보고되었으며 다음과 같다.
가. 신장계 : 두통, 어지러움
나. 소화기계 : 소화불량, 구토
다. 대사 및 영양 : 식욕부진
라. 근골격계 및 결합조직 : 근육통
마. 혈관계 : 안면홍조
중대한 이상사례로는 충수염, 간세포염, 대퇴부 골절이 보고되었으며, 인과관계는 없었다.
- 일반정제에서 수집된 정보
1) 중대한 이상반응
 - (1) 출혈경향 : 뇌출혈 등의 두개내출혈(초기증상 : 두통, 구역·구토, 의식장애, 반신불수 등), 폐출혈, 때때로 피하출혈, 드물게 소화관 출혈, 비출혈, 안저출혈, 혈뇨 등의 출혈경향이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - (2) 혈액계 : 발혈구감소증, 무과립구증, 드물게 혈소판감소증, 백혈구감 소증, 재생불량성빈혈이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - (3) 간질성 폐렴 : 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선 이상, 호산구증가를 동반한 간질성 폐렴이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제의 투여 등 적절한 처치를 한다.
 - (4) 울혈성심부전, 심근경색, 협심증, 심실빈맥 등이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - (5) 황달, 때때로 AST, ALT, ALP, LDH 등의 상승이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 2) 기타의 이상반응
 - (1) 과민반응 : 광과민반응, 때때로 발진, 드물게 피진, 두드러기, 가려 움증이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - (2) 전신 : 두통증, 감염, 오한, 불쾌감, 경부강직, 골반통, 복막뒤출혈 이 나타날 수 있다.
 - (3) 순환기계 : 심방세동, 심방조동, 상실성 빈맥, 심실외 빈맥, 상실성 기외수축, 상실성 기외수축 등의 부정맥, 혈압하락, 체위성저혈압, 때때로 심계항진, 빈맥, 환각거림, 드물게 혈압상승이 나타날 수 있다. 이러한 경우에는 강압 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치 를 한다. 인과관계는 밝혀지지 않았으나 임상시험에서 뇌경색, 대 뇌허혈, 심장지, 심근허혈, 실신, 경맥류, 혈관확장이 보고되었다. 좌심실 유출로 폐색(빈도불명)*
 - (4) 정신신경계 : 불안, 신경통, 무력증, 이상한 꿈, 때때로 두통두증감, 어지러움, 불면, 저림감, 드물게 졸음, 전진이 나타날 수 있다. 이 러한 경우에는 강압 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - (5) 소화기계 : 대변이상, 소화불량, 담석증, 대장염, 위장지장장애, 심 이지장장애, 식도염, γ-GTP의 상승, 위염, 위염성, 잇몸출혈, 흑색 변, 소화궤양, 치주농양, 위궤양, 허부증, 때때로 복통, 구역·구토, 식욕부진, 설사, 속쓰림, 복부팽만감이 나타날 수 있다.
 - (6) 혈액 및 림프계 : 적혈구증가증, 자색반병, 출혈시간증가, 고혈소 판증, 호산구증가, 드물게 빈혈이 나타날 수 있다.
 - (7) 대사 및 영양계 : 안면부종, 말초부종, 통풍, 고지지방혈증, 드물게 혈 당상승이 나타날 수 있다.
 - (8) 근골격계 : 근육통, 관절통, 골통, 윗팔근염이 나타날 수 있다.
 - (9) 호흡기계 : 기침증가, 인두염, 비염, 천식, 무비듬염, 폐렴이 나타날 수 있다.
 - (10) 내분비계 : 당뇨병이 나타날 수 있다.
 - (11) 피부 및 부속기계 : 건조한 피부, 홍기, 피부부대가 나타날 수 있다.
 - (12) 감각기계 : 약시, 실명, 복시, 귀통증, 드물게 이명, 결막염이 나타 날 수 있다.
 - (13) 비뇨생식기계 : 단백뇨증, 방광염, 질출혈, 질염, 드물게 빈뇨가 나 타날 수 있다.
 - (14) 신장 : 신부전, 신기능이상, 드물게 BUN, 크레아티닌, 요산의 상 승이 나타날 수 있다.
 - (15) 기타 : 때때로 발한, 부종, 홍통, 드물게 등통, 견타감, 발열이 나

- 타할 수 있다.
- * : 자발적 보고 또는 해외에서 발생한 이상반응의 경우 빈도불명으 로 표시
- 3) 실로스타졸 일반정제의 국내재상사결과
국내에서 시판후 조사기간 동안 650례를 대상으로 실시한 안전성 평 가 결과 이상반응의 발현율은 인과관계 여부와 상관없이 34례에서 38건(5.24%)으로 보고되었다. 이 중 약물과의 인과관계를 배제할 수 없는 이상반응 발현율은 29례에서 33건(4.47%)으로 다음과 같다.
가. 중추 및 말초신경계 이상 : 두통 2.77%(18례/650례), 불안(홍분) 0.15%(1례/650례)
나. 위장관계 이상 : 설사 0.46%(3례/650례), 구역 0.31%(2례/650 례), 소화불량증 0.15%(1례/650례), 구토 0.15%(1례/650례), 식욕 부진 0.15%(1례/650례), 복통 0.15%(1례/650례)
다. 피부 및 부속기관 이상 : 소양감 0.15%(1례/650례), 발진 0.15%(1 례/650례)
라. 정신신경계 이상 : 경면 0.15%(1례/650례)
리. 심박 이상 : 심계항진 0.15%(1례/650례)
이 중 현재 허가사항에 기재되어 있지 않은 예상하지 못한 새로운 이 상반응으로 약물과의 인과관계 여부와 상관없이 골격이상, 각담낭자 각 0.15%(1/649명, 1건)이었으며, 중대한 이상반응은 인과관계 여부 와 상관없이 구토, 골격이상, 출혈이 각각 0.15%(1/649명, 1건)이었도.
- 4) 국내 시판 후 이상사례 보고자료(1989~2015년)를 토대로 실마리정보 분석·평가 결과 새로 확인된 이상사례는 다음과 같다. 다만, 이로서 곧 해 당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 감각기관계 : 감각저하

5. 일반적 주의

- 1) 실로스타졸의 뇌경색 환자에 대한 투여는 뇌경색의 증상이 안정된 후에 시작한다.
- 2) 뇌경색 환자에 대한 투여시 다른 항혈소판제 등과의 상호작용에 주의함과 동시에 고혈압이 지속되는 환자에 대한 투여도 신중히 해야 하며, 투여중에는 혈압을 충분히 조절해야 한다.
- 3) 관동맥 협착의 합병증이 있는 환자에서 실로스타졸 투여중 과도한 맥박 수 증가가 나타났을 경우에는 협심증을 유발할 가능성이 있으므로 이러 한 경우에는 강압 또는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 4) 환자에게 출혈과 가벼운 타박상, 발열, 인후염과 같은 혈액질환의 조기 발현을 의미하는 어떠한 징후도 신속히 보고하도록 주지시켜야 한다. 감 염이 의심되거나 혈액질환의 임상적 징후가 있으면 전혈구수를 측정해 야 한다. 혈액학적 이상의 임상 또는 실험실적 징후가 있으면 이 약의 투 여는 즉시 중단되어야 한다.
- 5) 실로스타졸은 어지러움을 일으킬 수 있으므로 운전이나 기계조작 전에 주의하도록 주지시켜야 한다.
- 6) 음식물과 함께 이 약을 복용하면 이 약의 혈중농도가 상승하여 이상반 응 발생율이 증가될 수 있으므로 공복시 투여하며, 식사와 약물투여간 의 시간 간격은 3시간으로 하는 것을 권장한다. 특히, 이 약 200mg을 고지방식 후 단회 투여한 결과, 공복투여에 비하여 흡수가 증가하여 C_{max}는 135%, AUC는 37%의 상승을 보였으므로 고지방식을 섭취하는 환자의 경우에는 특히 주의한다.
- 7) 실로스타졸은 PDE Ⅲ 저해작용을 가지는 약물이다. 외국에서는 PDE Ⅲ 저해작용을 가지는 감성제에 대해 울혈성심부전(NYHA 분류 Ⅲ ~Ⅳ)환 자를 대상으로 한 위약대조 장기투여비교시험에서, PDE Ⅲ 저해작용을 가지는 감성제에서의 생존율이 위약에 비하여 낮았다는 보고가 있다. 또 한, 울혈성심부전을 나타내지 않는 환자에 있어, 실로스타졸을 포함한 PDE Ⅲ 저해제를 장기투여한 경우의 예후는 분명하지 않다.
- 8) 뇌경색 발발억제 효과를 검토하는 시험에서 위약군에 비해 실로스타졸 군에서 당뇨병의 발증에 더 약해가 많이 나타났다(이 약군 11/520례, 위약대조군 1/523례).
- 9) 무증후성 뇌경색에 대하여 실로스타졸의 뇌경색 발작억제효과에 대한 시험은 실시된 바 없다.
6. 상호작용
 - 1) 실로스타졸은 주로 큰 대사효소인 CYP3A4 및 일부 CYP2D6, CYP2C19 에 의해 대사된다.
 - 2) 항응고제(와파린 등), 항혈소판제(아스피린, 티클로피딘 등), 혈전용해제 (유로키나제, 알테플라제 등), 프로스타글란딘 E제제 및 그 유도체(알 프로스타리딜, 리마프로스트, 알파엑스 등)는 출혈을 조정할 우려가 있으 로 혈액응고능 검사 등을 충분히 실시하면서 사용한다.
 - 3) CYP3A4저해제나 CYP2C19저해제(시메티딘, 딜티아젠티, 에리스로마이 신, 케토코나졸, 란소프라졸, 이트라코나졸, 미코나졸, 오메프라졸, HIV-1 단백질해효소 저해제 등)와의 병용에 의해 이 약의 혈중 농도가 상승 하여 작용이 증가할 우려가 있다. 병용하는 경우에는 강압, 또는 저용량 부터 시작하는 등 주의해야 하며, 또한 지용수소와 동시 복용하지 않도록 주의한다.
 - 4) CYP3A4나 CYP2C19의 기질이 되는 약물(사사피리드, 미다졸람)과의 병용에 의해 이 약의 혈중 농도가 상승하여 작용이 증가할 우려가 있다. 병용하는 경우에는 강압 또는 저용량부터 시작하는 등 주의해야 한다.
 - 5) 이 약은 반사빈맥으로 추가적인 저혈압효과가 있을 가능성이 있기 때문 에 혈압을 저하시키는 잠재성이 있는 약물 또는 디하이드로피리딘계 칼슘

- 제일차단제와 같이 반사빈맥을 일으키는 혈관확장제와 병용할 때 주의 가 필요하다.
- 6) 실로스타졸 100mg과 HMG-CoA 환원효소 저해제 로바스타틴 80mg을 병용투여시, 로바스타틴 단독투여에 비해 로바스타틴의 AUC 가 64% 증가했다는 해외 보고가 있다.
- 7) 케토코나졸, 에리스로마이신, 오메프라졸 : CYP3A4 저해제인 케토코나졸 400mg과 병용투여시 C_{max}는 94%, AUC는 117% 증가하였고, 에리스로마 이신 500mg과 병용투여시 C_{max}는 47%, AUC는 73% 증가되었다. CYP2C19 저해제인 오메프라졸과 병용투여시 대사체인 3,4-dehydro-clotiazole이 69% 증가하였다.)
- 7. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 동물실험(랫트)에서 임신태자의 증가 및 출생시의 저체중, 사망의 증가 가 보고되었으며로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않는다.
 - 2) 동물실험(랫트)에서 유증중으로의 이행이 보고되었으므로 투여 중에는 수유를 중단한다.
- 8. 소아에 대한 투여
저체중출생아, 신생아, 영·유아, 또는 소아에 대한 안전성이 확립되어 있 지 않다(사용경험이 적다).
- 9. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람하는 등 주의한다.
- 10. 과량투여시의 처치
사람에게 있어 이 약의 급성 과량투여에 대한 정보는 제한적이다. 급성 과 량투여의 증상과 징후는 중증 두통, 설사, 저혈압, 빈맥, 또는 심부정맥으로 예상된다. 환자를 주의깊게 살피고 지지 및 보조적인 치료를 행한다. 이 약 이 높은 단백결합을 하기 때문에 혈액투석이나 복막투석으로 효과적인 제 거가 어려울 것이다. 적절한 구토나 위세척으로 위를 비워야 한다. 이 약의 경구 LD50은 마우스와 랫트에서 >5.0g/kg, 개에서 >2.0g/kg 이다.
- 11. 기타
 - 1) 신기능 장애 환자의 체내 동태 : 중증 신장애 환자에게 1일 실로스타졸 일반정 100mg을 8일간 연속해서 경구투여 시, 건강한 성인에 비해 이 약의 C_{max}는 92%, AUC는 39% 감소하였으나, 활성대사체의 C_{max}는 173%, AUC는 209% 증가하였다. 경증 및 중증도 환자에서는 유의적인 차이가 없었다. 중증 신기능 저하 환자에게는 신중히 투여한다.
 - 2) 신기능 장애 환자의 체내 동태 : 경증 신장애 환자에게 실로스타졸 일반 정 100mg을 단회 경구투여 시, 혈중농도가 건강한 성인과의 차이를 보 이지 않았다(C_{max}는 7% 감소, AUC는 8% 증감). 중증도 또는 중증 신기능 저하 환자에게는 신중히 투여한다.
 - 3) 비글을 이용한 13주 및 52주 반복경구투여독성시험에서, 고용량의 경우 좌심실심내막의 비후, 관상동맥의 장애가 인정되었으며, 무독성량은 각 각 30mg/kg/day, 12mg/kg/day였으나 이러한 변화는 랫트 및 원숭이 에서는 인정되지 않았다. 비글의 경우 1주간 정맥투여한 심장독성시험 에서 좌심실심내막, 우심방심외막 및 관상동맥의 변화가 나타났으며, 원 숭이의 경우 경증 좌심실심내막의 출혈성 변화가 인정되었다. 다른 PDE 저해제와 혈관확장제의 병용에도 동물에 대한 심장독성이 인정되었으 며, 특히 개에서 독성발현이 쉽게 나타났다는 보고가 있다.
 - 4) 유전적으로 현저하게 높은 혈압이 지속되어 뇌졸중이 발병되는 SHR-SP(뇌졸중이 발생하기 쉬운 고혈압자원발증 랫트, stroke-prone spontaneously hypertensive rats)에서, 이 약 0.3% 혼합식이군은 대조 군과 비교해 생존기간의 단축이 인정되었다(평균수명 : 이 약군 40.2주, 대조군 43.5주). 끝.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(~30℃)보관

【포장단위】 5정/병, 30정/병, 100정/병

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

- * 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우 에는 구입처에서 교환해 드립니다.
- * 제품에 대한 기타 자세한 사항과 이후 변경된 내용은 의약품정보(02-516-6103)로 문의하시기 바랍니다.
- * 부작용 피해를 주지 않 : 한국의약품 안전관리원(1644-6223), 부작용 피해 구제 전용 상담(14-3330)

TS1175-20222

작성년월일 : 2022년 2월 22일

제조사



한국유나이티드제약 (주)
세종특별자치시 전통동 노공공단길 25-23

제외처



한국바이오켄제약(주)
세종특별자치시 전의면 산단길 204