

위산과다 · 속쓰림 · 신트림... 위장약 파모틴정 10밀리그램

(파모티딘 Famotidine 10mg)

일반의약품
분류번호 : 232

정부공인
KGMP
무수의약품지정업체

【원료약품의 분량】

파모티딘(파마) 10mg

· 첨가제(타르색소) : 황색203호, 청색 1호
· 동물유래성분 : 유당수화물 (소, 우유)
· 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탄탈드녹색(5G332)

【상상】 연녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 신트림

【용법·용량】 16세 이상 1회 1정(10mg), 1일 2정(20mg)까지 복용할 수 있다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약의 성분 및 다른 H₂ 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), 락포 유당분해효소 결핍증(lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈(혈액 섞인)이나 혈변이 있는 경우
- 2) 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우
- 3) 헛기름(머리띠) 또는 출혈 식염수에 함께 나타나는 경우
- 4) 짧은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
- 5) 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우
- 6) 예상치 않은 체중감소, 오심, 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우
- 7) 비스테로이드성 소염항염진통제를 복용하고 있는 경우
- 8) 약물에 대한 과민증과 병력이 있는 환자
- 9) 신장(배설장기)에 현재 혈중 농도가 증가될 수 있다
- 10) 심혈관 현재 심혈관계의 이상반응을 일으킬 수 있다
- 11) 간장애 환자(증상이 악화될 수 있다)
- 12) 고령자(노인)
- 13) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다)
- 14) 수유부 (모유 중으로의 이행이 보고되어 있다)
- 15) 다음의 약물을 복용하는 경우 : 무침조제(이 약의 위산분비 억제 작용이 아졸계 항산균(곰팡이)제에, 이트라코나졸의 경우 흡수를 저하시킨다)
- 16) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 해당(이)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유지를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 증상이 지속되거나 악화되는 경우
- 2) 이 약은 14일 이상 복용하지 않는다.
- 3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉시 중지하고 의사, 약사와 상의한다.
 - ① 과민증 : 속, 호흡곤란, 전신홍조(몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴 부기), 인두부종(목 부기), 두드러기 등
 - ② 혈액 : 백혈구 감소, 적혈구 감소, 혈소판감소(지혈지연과 동일한 의미), 호산구감소, 빈혈, 지혈지연(전신관통, 무력, 마비(마비) 점 막하 출혈, 발열)
 - ③ 피부 : 피부점막인종(눈, 표피과사증, 발진, 두드러기(홍반))

- ④ 간 : 간기능 이상, AST(GOT) · ALT(GPT) 등의 상승, 총빌리루빈 · LDH 상승, 황달, 간염
- ⑤ 근골격계 : 근육통, 횡문근융해증(횡문근융해), 관절통, 근육경련
- ⑥ 순환기계 : 서맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 혈압상승, 안면 홍조, 이명(귀울림)
- ⑦ 장신진경제 : 의식장애, 경련, 전신관통, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각이상, 두중감(머리무거움), 혼돈, 우울, 어지러움
- ⑧ 소화기계 : 변비, 설사, 구갈, 구역구토, 복부(배)부종(팽만), 식욕 부진, 구내염(안인)
- ⑨ 비뇨생식계 : 간질성 신염(신장염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상(BUN · 크레아티닌 상승 등), 월경불순
- ⑩ 호흡기계 : 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지염
- ⑪ 기타 : 여성형유방, 마각이상

4. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 이 약의 투여로 위염에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용한다.
- 2) 알코올이 함유된 음료와 복용하지 않도록 한다.
- 3) 이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담한다.
- 4) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용할 경우 탄산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있다.
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재하고 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【소비자상담】 070-4224-7379

【포장단위】 10정/PTP, 20정(10정/PTP)*2, 120정(10정/PTP)*12, 240정(10정/PTP)*12*2, 30정/병, 300정/병

【제조사】 한국코러스 / 충청북도 제천시 강서로 30

【판매처】 (주)경보제약 종근당홀딩스 가족회사

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변태 또는 오염되거나 손상된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해드립니다.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 처방에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)