

파탁 TM

정 10mg / 파모티딘

일반의약품

분류번호 : 소화성장애용제

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정(140mg) 중

■ 유효성분 : 파모티딘(KP).....10mg

■ 첨가제(타르색소) : 청색호 황색203호

■ 첨가제(동물유래) : 유당수화물, 우유

■ 기타첨가제 : 미질정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 탈립드녹색(S9G392)

[성상] 연녹색의 원형 필름코팅정

[효능·효과] 위산과다, 속쓰림, 신트림

[용법·용량] 16세 이상 1회 1정, 1일 2정까지 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

1) 이 약의 성분 및 다른 H₂ 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자

2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

1) 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈(혈액구토)이나 혈변이 있는 경우

2) 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우

3) 헛기름(어지러움) 또는 졸림, 식은땀이 함께 나타나는 경우

4) 췌관 호르몬과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우

5) 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우

6) 예상치 않은 체중감소, 오심구역, 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우

7) 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하고 있는 경우

8) 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자

9) 신장에(신장장애) 환자(혈중 농도가 증가될 수 있다)

10) 심혈관 환자(심혈관계의 이상반응을 일으킬 수 있다)

11) 간장애 환자(증상이 악화될 수 있다)

12) 고령자(노인)

3. 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.)

4) 수유부 (모유 중으로의 이행이 보고되어 있다.)

5) 다음의 약물을 복용하는 경우 : 무중치로제이 약의 위산 분비 억제작용이 아줄제 항산(공명)약에, 이트라코나졸)의 경우 흡수를 저하시킨다.)

6) 고지단백혈중, 당뇨병성고지질혈증 및 헤장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

1) 증상이 지속되거나 악화되는 경우

2) 이 약은 14일 이상 복용하지 않는다.

3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다.

① 과민증 : 속, 호흡곤란, 전신홍조(몸이 붉어짐), 안면부종 (얼굴부기), 인두부종(부기), 두드러기 등

② 혈액 : 백혈구 감소, 적혈구 감소, 혈소판감소(지혈지연과 동일한 의미), 호산구감소, 빈혈, 지혈지연(전신관태감, 무력, 파해(피부발)점막하 출혈, 발열)

③ 피부 : 피부점막안홍증후군, 표피괴사증, 발진, 두드러기(홍반)

④ 간 : 간기능 이상, AST(GOT)·ALT(GPT) 등의 상승, 총빌리루빈·LDH 상승, 황달, 간염

⑤ 근육결계 : 근육통, 횡문근융해증(횡문근융해), 관절통, 근육 경련

⑥ 순환기계 : 서맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 혈압 상승, 안면홍조, 이명(귀울림)

⑦ 정신신경계 : 의식장애, 경련, 전신관태감, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각이상, 두중감(머리무거움), 혼돈, 우울, 어지러움

⑧ 소화기계 : 변비, 설사, 구갈, 구역구토, 복부(배부분) 팽만감, 식욕부진, 구내염(입안염)

⑨ 비뇨생식계 : 간질성 신염(신장염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상(BUN·크레아티닌 상승 등), 월경불순

⑩ 호흡기계 : 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지염

⑪ 기타 : 여성형유방, 이마이상

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 이 약의 투여로 위암에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용한다.

2) 알코올이 함유된 음료와 복용하지 않도록 한다.

3) 이 약을 투여 후 약과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담한다.

4) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용할 경우 탄산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있다.

5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 한다. 환자가 다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 등의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것

2) 약박을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

[저장방법] 기밀용기, 실온(~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 20정/상자(10정/PTP×2), 240정/상자(10정/PTP×24)

[제조사] 한국코리스(주) 충청북도 제천시 강서로 30

[제조외주] (주)라이프마크 서울특별시 구로구 디지털로 272 108호(구로동)

[판매처] (주)경보제약 충청남도 아산시 실옥로 174

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.

※ 본 설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참조하시기 바랍니다.

※ 이 제품 설명서 작성년월일 이후 변경된 내용은 소비자상담실(02-801-8570)로 문의하시기거나 또는

식품의약품안전처 의약품통합정보시스템

(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청을 한국의약품안전관리원

(1644-6223)에서 할 수 있습니다.