

제일 치오스민 정

디오스민
600mg

치질·정맥류에 의한 통증(통증)·부종(부기)

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정(952.99밀리그램) 중

- 유효성분 : 디오스민(EP)..... 600mg
- 첨가제(타르색소) : 황색5호
- 기타첨가제 : 탈크, 콜로이드성이산화규소, 탭실드분홍색(19P262), 스테아르산, 미결정셀룰로오스, 오파글로스 6000 화이트/오프-화이트

[성 상] 분홍 또는 연분홍의 원형 필름코팅정제

[효능·효과]

1. 정맥부전과 관련된 증상의 개선 : 다리 중압감, 통증 2. 모세혈관 취약증에 의한 장액의 보조치료 3. 치질과 관련된 징후의 치료

[용법·용량]

정맥 부전 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 1회 (매일 아침 식전에) 복용한다. 치질 : 디오스민으로서 1회 600mg 1일 2 ~ 3회(1,200~1,800mg) 식사 시 복용한다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
- 1) 이 약 성분에 과민증이 있는 환자 2) 수유부
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
- 1) 임부(필요한 경우에만 이 약 투여가 고려되어야 한다.)
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것 이 약 투여 후 소화장애가 나타날 수 있으나, 치료를 중단하는 경우는 드물다.
4. 기타: 이 약의 복용 시 주의할 사항 이 약을 투약해도 다른 항문 질환에 대한 특별한 치료법이 면제되지 않는다.
- 이 약은 오랜 기간 투약하지 말아야 한다. 증상이 빨리 나아지지 않으면, 항문검사를 실시해야 하며 치료를 재검토해야 한다.
5. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기한] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 60 정/상자(10정/PTP×6), 30 정/병

※ 구입시 사용기간이 경과하였거나 변질 또는 오소민 제품은 약국, 병원, 의원, 도매상 개설처에 한하여 교환하여 드리오니 이와 같은 제품은 구입 유통 경로를 통해서 반송하여 주시기 바랍니다.
소비자 문의는 본사 마케팅부(수신자부담:080-549-0002)에서 상담해 드리며, 제조과정과 관련된 제품의 품질에 대한 문의사항은 백암공장 품질경영본부(전화: 080-332-0002)로 연락바랍니다.
제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다. *설명서작성년월일 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(www.jeilhs.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.*

[제조외 및 판매인]



제일헬스사이언스 경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 7 B동

설명서 작성년월일 2020.06.18

[제조원]

풍림무약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 120

1E18-H000-V6-02