

판다모

캡슐

[원료의약품 및 그 분량]

이 약 1캡슐(394 mg) 중

• 유효성분: 약용효모(별규)	100mg
케라틴(별규)	20mg
(총 아미노산으로서 히스티딘 1,22mg, 류신 4,91mg, 리신 4,1mg)	
티아민질산염(KP)	60mg
판토텐산칼슘(KP)	60mg
L-시스틴(KP)	20mg
파라아미노벤조산(USP)	20mg

- 첨가제(동물유래성분): 케라틴(돼지, 발톱), 젤라틴(소-가죽, 돼지-피부)
- 첨가제(타르색소): 황색5호, 황색203호, 청색1호, 적색40호
- 기타첨가제: 스테아르산마그네슘, 캡슐, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈

[성상] 연회색 가루의 내용물이 든 상부 녹색, 하부 미황색의 불투명한 경질캡슐제

[효능·효과]

1. 손상된 모발, 감염성이 아닌 손톱의 발육 부진
2. 탈모의 보조치료

[용법·용량]

성인: 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.
12세 이상 소아: 1회 1캡슐을 1일 1~2회 식후에 복용한다.
12세 미만은 복용하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 사람
 - 2) 12세 미만 소아
2. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 위통, 구토 등 위장관 불쾌감과 발한(땀이 남), 빈맥(빠른 맥), 가려움, 두드러기, 두통, 어지럼, 홍조
 - 2) 두부 이외의 신체부위에서 발모현상이 나타나는 경우
 - 3) 정해진 용법·용량대로 3~4개월 사용 후에도 증상의 개선이 보이지 않을 경우
 - 4) 증상이 지속되거나 기대하는 효과가 나타나지 않는 경우
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 설폰아미드 제제와 동시 복용 시 주의할 것.
 - 2) 흉터로 인한 탈모나 안드로젠 유전성 탈모증, 남성형 대머리에는 사용하지 말 것.
 - 3) 이 약은 당뇨병 환자에 복용할 수도 있다.
 - 4) 평균 치료 기간은 3~6개월이다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 사용기한이 초과된 것은 복용하지 말 것.
 - 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 외부포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

[포장단위] 300캡슐/상자(10캡슐/피티파x15)x2상자), 150캡슐/상자(10캡슐/피티파x15)

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL: 080-203-6000) 에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품 검색' 란을 참조하세요.

[소비자상담] 080-203-6000 (수신자 요금부담)

[부작용 보고] 한국의약품안전관리원(1644-6223)

[제조회사]

코오롱제약(주), 대전광역시 대덕구 문평서로18번길 45

[제조사]

㈜마더스제약, 경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18