

파모트리 정 10밀리그램

(파모티딘)

[원료약품 및 그 분량]

- 유효성분 : 파모티딘(KP) 1정 중 10.0mg
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
- 첨가제(타르색소) : 황색203호, 황색1호
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산나트륨, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 덩이당, 녹색(SG392)

[성상] 연녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 위산과다, 속쓰림, 신트림

【용법·용량】 16세 이상 1회 1정(10mg), 1일 2정(20mg)까지 복용할 수 있다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 이 약의 성분 및 다른 H₂ 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자
- 2) 이 약을 유당을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 도열(열이 구역이나 열병이 있는 경우)
- 2) 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우
- 3) 현기증(어지러움) 또는 졸림, 식은땀이 함께 나타나는 경우
- 4) 잦은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
- 5) 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우
- 6) 예상치 않은 체중감소, 오심(구역), 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우
- 7) 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하고 있는 경우
- 8) 약물에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
- 9) 신장에(신장장애) 환자(신장기능이 중증으로 저하될 수 있다)
- 10) 심혈관 환자(심혈관계의 이상반응을 일으킬 수 있다)
- 11) 간장에 환자(증상이 악화될 수 있다)
- 12) 고령자(노인)
- 13) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.)
- 14) 수유부(모유 중으로의 이행이 보고되어 있다.)
- 15) 다음의 약물을 복용하는 경우 : 무조제초(이 약의 위산 분해 작용이 아질계 합성(공명)에 의해, 이트라나졸)의 경우 흡수를 저하시킨다.)
- 16) 고지단백혈증, 당뇨병성 고지혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 산중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 증상이 지속되거나 악화되는 경우
- 2) 이 약은 14일 이상 복용하지 않는다.
- 3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉시 중지하고 의사, 약사와 상의한다.
 - ① 과민증 : 소, 효모관련, 전신홍조(온몸이 붉어짐), 연면부종(얼굴 부기), 인두부종(목구멍), 두드러기 등
 - ② 혈액 : 백혈구 감소, 적혈구 감소, 혈소판감소(지혈제와 동일한 의미), 호산구 감소, 빈혈, 지혈제(전신관 대장, 무력, 피하(피부) 점막) 출혈, 발열
 - ③ 피부 : 피부염(피부 자극), 피부파괴성 발진, 두드러기(홍반)
 - ④ 간 : 간기능 이상, AST(GOT)·ALT(GPT) 등의 상승, 총 빌리루빈·LDH 상승, 황달, 간염
 - ⑤ 근골격계 : 근육통, 횡문근융해증(횡문근융해), 관절통, 근육경련

⑥ 순환기계 : 서맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 혈압 상승, 안면홍조, 이명(귀울림)

⑦ 정신신경계 : 의식장애, 경련, 전신관대감, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 상욕감, 감각이상, 두통

⑧ 소화기계 : 변비, 설사, 구강, 구역, 구토, 복부(배부)팽만감, 식욕부진, 구내염(입안염)

⑨ 비호르몬성 : 간질성 신염(신장염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상(BUN·크레아티닌 상승 등), 월경불순

⑩ 호흡기계 : 고열, 기침, 호흡관련 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지염

⑪ 기타 : 여성형유방, 미각이상

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 이 약의 투여로 위염에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 복용한다.
- 2) 알코올이 함유된 음료와 복용하지 않도록 한다.
- 3) 이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담한다.
- 4) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합체를 병용할 경우 탄산칼슘 용해 손실 위험이 발생할 수 있다.
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자가 이 약을 복용할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내분포에 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 복용을 적절히 조절해야 한다. 환자가 다른 정제를 자질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약의 부형제로 존재되어 있는 자질의 양을 고려하여 그 자질제의 투여량을 감소해야 한다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약의 물·오염(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 약품의 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭대기 보관할 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 20정/상자(10정/PTP×2), 120정/상자(10정/PTP×12),

240정/상자(10정/PTP×12)×2

【제조(외)사】  네드트리 / 경기도 남양주시 경강로 27

【제조(외)사】  한국 코코스 / 충청북도 천안시 강서로 30

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서서 중의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 본 의약품은 KGM(국립약품정보센터)에서 제조하여 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변색 또는 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하십시오.

※ 기타 자세한 사항이나 문의의 작성일자(2020.02.11) 이후 변경된 내용은 소비자상담실(080-558-7575)로 문의하시기 바랍니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)