

혈압강하제

암로베핀정

(암로디핀베실산염)

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정(200mg)중 유효성분: 암로디핀베실산염 (EP).....6.944mg (암로디핀으로서 5.0mg)
첨가제: 무수인산수소칼슘, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분, 타크로스나트륨

[성상] 흰색의 팔각형 정제
[효능효과]
1. 고혈압, 관상동맥의 고지혈제(안정형협심증) 또는 관상혈관계의 혈관 경련과 혈관수축(이형협심증)에 의한 심근심혈충
2. 최근 혈관조영술로 관상동맥질환이 확인된 환자나 심부전이 없거나 심박출량이 40% 미만인 아닌 환자의 협심증으로 인한 인원의 위험성 감소
-관상동맥 혈관재술에 대한 위험성 감소
[용법용량]
성인 : 암로디핀으로서 1회 1회 5mg을 경구투여하며 환자의 반응에 따라 1일 최고 10mg까지 증량할 수 있다.
어른, 중성에 따라 적절히 증량한다.

[사용상의 주의사항]
1. 다음 환자에게는 투여하지 것
(1) 이 약 또는 다른 디하이드로피리딘계 약물(암로디핀은 디하이드로피리딘계 칼슘채널차단제이다)에 과민증의 병력이 있는 환자
(2) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
(3) 중증의 간기능장애 환자
(4) 중증의 대동맥판협착증 환자
(5) 속 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
(1) 심증의 저혈압 환자
(2) 투석을 해야 하는 신부전 환자
(3) 고령자
3. 이상반응
(1) 암로디핀은 내약성이 좋다. 고혈압 및 협심증환자에 대한 위약대조 임상시험에서, 가장 흔하게 나타난 이상반응은 다음과 같다:
혈관계: 홍조
전신: 피로, 부종
심혈관계: 심계항진
중추 및 말초신경계: 현기증, 두통, 졸음
소화기계: 복통, 오심
임상시험에서 이 약과 연관되어 임상적으로 유의한 실험실검자 이상은 관찰되지 않았다.
2) 시한 후 비교적 적은 빈도로 관찰된 이상반응은 다음과 같다:
전신: 두력, 편대감, 통증, 체중의 증가/감소
혈관계: 저혈압, 혈관염
신경계: 긴장형진, 감각저하/감각이상, 말초신경병증, 실신, 미각이상, 진전, 추체외로 장애
생식기계: 발기기능장애, 여성형 유방
소화기계: 배변습관의 변화, 구강건조, 소화불량(위염), 치은 비후, 궤양, 구토
대사/영양: 고혈당
근골격계: 관절통, 요통, 근육경련, 근육통
혈액 및 임프계: 백혈구감소증, 혈소판감소증
정신계: 불면, 기분변화
호흡기계: 기침, 호흡곤란, 비염
피부/부속기계: 발모, 다한증, 자반병, 피부 변색, 두드러기, 독성표피 괴상형
감각기계: 귀에서 소리가 남, 시각이상
비뇨기계: 배뇨빈도 증가, 배뇨장애, 야뇨증
간담도계: 간염, 황달, 간초초치의 상승 등이 매우 드물게 보고되었음
이, 이들의 대부분은 담즙을체성과 관련이 있었다. 인원이 필요할 만큼 중증이었던 일부 경우에는 암로디핀의 사용과 연관이 있다고 보고되었으나, 대부분 많은 경우에는 암로디핀과의 인과관계가 불명확하다.
드물게 소양증, 발진, 혈관부종, 다형성홍반을 포함한 알레르기반응이 보고되었다.
3) 다른 칼슘채널 저해제에서와 마찬가지로, 다음의 이상반응들이 드물게 보고되었는데 이들이 기저질환으로 인한 것인지 약물에 의한 것인지 구별을 할 수 없었다: 심근경색, 부정맥(서맥, 심실성빈맥, 심방성세동 포함), 흉통
4) 기타 다음과 같은 이상반응이 관찰되었다.

의약품을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오

전문의약품
분류번호 : 214

심혈관계: 때때로 혈압강하, 동방블록 또는 방실블록, 드물게 복부불쾌감 등이 나타날 수 있다.
소화기계: 때때로 심와부통, 설사, 묽은 변, 변비 등이 나타날 수 있다.
피부: 드물게 피부홍종증, 반점성 구진성 발진 등이 나타날 수 있다.
기타: 때때로 두중, 열감, 내당력하차, 쇠약 등이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
(1) 심부전환자에 대한 투여: 허혈성 병인이 없는 뉴욕심정협회(NYHA) III, IV등급의 심부전환자에 대한 암로디핀의 장기간, 위약대조시험(PRAISE-2)에서 암로디핀은 위약과 비교 시 심부전의 악화로에 유의적인 차이 없음에도 불구하고 폐부종 보고의 증가와 연관이 있었다.
(2) 간기능 손상환자에 대한 투여: 모든 칼슘 antagonist와 마찬가지로 암로디핀의 반감기는 간기능부전환자에서 길어졌으며, 이들 환자에 대한 권장용량은 확립되지 않았다. 그러므로, 이런 환자들은 주의하여 투여한다.
(3) 혈당장애 반감기가 길어 투여를 중단한 후에도 안전한 혈압강하작용이 나타나므로, 투여 중지 후 다른 혈압강화제를 투여하는 경우에는 용량 및 투여간격에 주의하고 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
(4) 효과발현이 천천히 나타나므로 응급 치료를 요하는 불안정형협심증에는 효과를 기대할 수 없다.
(5) 운전 및 기계사용에 대한 영향
암로디핀의 임상적 사용경험에 근거하여 볼 때 암로디핀은 운전 또는 기계사용능력을 저하시키지는 않는 것으로 보인다.
5. 상호작용
(1) 암로디핀은 티아지드계 이뇨제, 일파치단제, 베타차단제, ACE저해제, 작용기간이 긴 질산염제제, 니트로글리세린, 세하정, 비스테로이드성소염제, 항생제, 경구 혈당강화제와 병용 시 안전하였다.
(2) 사용혈당을 이용한 실험실적자로는 암로디핀이 디곡신, 페나토인, 와파린, 인도메타신의 단백질결합에 영향을 미치지 않는다는 것을 알라준다.
(3) 자용증수: 20명의 건강한 자원자에서 240 mL의 자용증수와 암로디핀 10 mg의 난회용형은 암로디핀의 약동학에 유의한 영향을 미치지 않았다. 이 시험에서 암로디핀의 주 대사산인 CYP3A4에서 유전적 다형성 (genetic polymorphism)에 대한 영향평가는 이루어지지 않았다. 따라서, 암로디핀은 자용이나 자용증수와 병용 시 일부 환자에서 생체이용률 증가로 인한 혈압강하 효과의 증가가 나타날 수 있으므로, 병용투여를 권장하지 않는다.
(4) 덴트올린 (주인): IV를 통해 비파괴, 덴트올린을 투여하는 동물실험에서 치명적인 심실연축이 지속적으로 관찰되었다. 암로디핀과 덴트올린의 동시투여는 피해야 한다.
(5) 비클로렌: 혈압강하 효과를 증가시키므로, 필요한 경우 혈압과 용량을 주의하여 투여한다.
(6) 클레트리로마이신: 클레트리로마이신은 시토크롬 P3A4 저해제이다. 클레트리로마이신을 이 약과 병용투여시 저혈압의 위험이 증가하였다. 이 약과 클레트리로마이신을 병용투여시 환자를 주의깊게 관찰하는 것이 권장된다.
(7) 다른 약물들이 암로디핀에 미치는 영향
(1) 아미타딘: 암로디핀과의 병용투여 시 암로디핀의 약동학에 영향이 없었다.
(2) 알루미늄/마그네슘 (제산제): 알루미늄/마그네슘 제산제와 난회용형의 암로디핀과 병용투여 시 암로디핀의 약동학에 유의적인 영향이 없었다.
(3) 실디나필: 월발성 고혈압환자에 실디나필 100mg 난회용형의 투여는 암로디핀의 약동학적 파라미터에 영향을 미치지 않았다. 암로디핀과 실디나필을 병용투여 시, 각 약물은 단독적으로 각각의 혈압저하효과를 발휘한다.
(4) 시토크롬 P3A4 저해제: 고령의 (만 69세-87세) 고혈압환자에서 1일 50mg/180 mg과 암로디핀 5 mg의 병용투여는 암로디핀의 전신노출을 57%까지 증가시켰다. 건강한 자원자 (만 18-43 세)에서 에리트로마이신의 병용투여는 암로디핀의 전신노출을 유의적으로 변화시키지 않았다(AUC의 22% 증가). 비록, 이 약에 대한 임상적 연관성은 밝혀지지지는 않았으나, 고령자에서 약동학적 변화가 나타날 수 있다. 강력한 시토크롬 P3A4 저해제 (예, 케토코나졸, 이트라코나졸, 리토나비어)가 암로디핀의 혈장 농도를 달리 이펙과의 병용투여에서 나타낸 것보다 더 높은 수치로 증가시킬 가능성은 배제할 수 없다. 암로디핀은 시토크롬 P3A4 저해제와 병용투여시 주의하여 투여한다. 그러나, 이런 약물상호 작용으로부터 기인한 이상반응은 보고된 바 없다.

(5) CYP3A4 유도제: CYP3A4 유도제 (예, 리팜피신, 세인트 존스 워트 (hypericum perforatum))와의 병용투여는 암로디핀의 혈장 농도를 변화시킬 수 있다. 그러므로 특히 강력한 CYP3A4 유도제와 병용투여하는 기간 및 그 이후에 혈압을 모니터링하고 용량 조절을 고려해야 한다.
(8) 암로디핀이 다른 약물들에 미치는 영향
(1) 이트르바스타틴: 이트르바스타틴 80 mg과 암로디핀 10 mg 다 회용량을 병용투여시 이트르바스타틴의 항정 약동학적 파라미터에 유의적인 변화가 없었다.
(2) 디곡신: 건강한 자원자에게 암로디핀과 디곡신을 병용투여 시 혈장 디곡신의 수치 혹은 디곡신의 신장 클리어런스에 변화가 없었다.
(3) 에탄올 (알코올): 10 mg 암로디핀의 난회 및 반복투여시 에탄올의 약동학에 유의적인 변화가 없었다.
(4) 와파린: 암로디핀과 와파린의 병용투여 시 와파린-프로트롬빈 반응시간에 영향이 없었다.
(5) 시클로스포린: 신장기능 환자를 대상으로 시클로스포린과 이 약을 병용투여한 여러 연구에서, 이 약과 병용투여시 시클로스포린의 최저혈중농도는 변화가 없거나 40%까지 증가하는 것으로 보고되었다.
(6) 티크로리우스: 이 약과 병용투여 시 티크로리우스의 혈중농도 증가 위험이 있으므로 티크로리우스로 치료 받는 환자에게 이 약 투여 시 티크로리우스의 혈중농도를 모니터링하고, 티크로리우스의 투여량을 적절히 조절하여 티크로리우스 독성을 피하도록 해야 한다.
(7) 심바스타틴: 암로디핀 10 mg과 심바스타틴 80 mg의 다회용량 병용투여는 심바스타틴 단독투여와 비교하여 심바스타틴의 노출을 77%정도 증가시켰다. 암로디핀을 투여받은 환자에서 심바스타틴 1일 최대 투여용량은 20 mg까지이다.
6. 일반 및 수유부에 대한 투여
(1) 이 약의 일반에 대한 안전성은 확립되었다. 인체에 대한 최대 권장 용량의 50배에 해당하는 용량의 암로디핀을 투여한 랫드에서 분만전 및 임신이 나타나 진통에 동등에 있어서 생식독성은 증명되지 않았다. 따라서, 일반에 대한 투여는 다른 안전한 대체약물이 없는 경우 및 질환 자체가 모체 및 태아에 큰 위험을 줄 경우에만 투여가 권장된다. 이 약을 투여한 랫드에서 수태능에 대한 영향은 없었다.
(2) 이 약의 수유부에 대한 안전성은 확립되지 않았다. 따라서, 이 약을 투여하는 동안에는 수유를 중단하는 것이 권장된다. 사람에 대한 투여 경험에서 암로디핀이 사람 모유 중으로 이행된다고 보고된 바 있다.
7. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않다.
8. 고령자에 대한 투여
일반적인 용량을 투여하는 것이 권장된다. 암로디핀을 고령자 및 젊은 연령의 환자에게 비슷한 용량으로 투여 시, 내약성이 동일하게 양호하다.
9. 과량투여에의 대처
심한 과량투여 시 과도한 말초혈관확장과 함께 반사성 빈맥도 나타날 수 있다는 것이 현재까지의 자료에서 언급되었다. 또한, 전신성 저혈압의 증세가 심하고 오랫동안 지속되어 속삭대에 이르게 되거나 속이 일어나는 치명적인 결과가 초래되었다고 보고되었다. 건강한 자원자에게 암로디핀 10 mg을 투여한 즉시 혹은 2시간 후까지 약용탄(activated charcoal)을 투여하였을 때 암로디핀의 흡수가 유의하게 감소되었다. 일부 경우에는 위세척이 유용할 수 있다. 이 약의 과량투여로 인한 임상적으로 심각한 저혈압은 심장과 호흡기능을 자주 모니터링하고, 사지의 위치를 올메타딘 등제 유지하여 혈액량과 같은 순환체액 및 노배혈량을 충분히 확보하는 등의 적극적인 심혈관계에 대한 보조요법을 필요로 한다. 혈관수축제 사용에 급기하는 특별한 경우가 아니라면, 혈관 긴장력 및 혈압을 회복해 다음 혈관수축제가 유용할 수 있다. 칼슘채널저해제의 효과를 만조시키는데 칼슘글루코산염의 정맥투여가 유용할 수 있다. 암로디핀은 디바칼슘염이므로 높은 용도로 혈액투석은 도움이 되지 않는다.
10. 의약품동등성시험 정보
가. 시험약 암로베핀정(암로디핀베실산염)[(한국파비스제약)]과 대조약 노바스코정(5mg리프린(암로디핀베실산염)[한국화이자제약])을 2x2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 시 난회 경구투여하여 37명의 혈당 암로디핀을 측정할 결과, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 평균치 치의 90%신뢰구간이 log 0.8에서 log 1.25 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-72h} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	노바스코정(5mg리프린) (암로디핀베실산염) (한국화이자제약)	93.43± 30.14	3.030± 1.304	6.00 (3.50-12.00)	37.69± 7.97
	암로베핀정 (암로디핀베실산염) (한국파비스제약)	90.53± 25.80	2.784± 0.903	6.00 (3.00-24.00)	41.85± 21.43

90% 신뢰구간* (기준 : log 0.8 ~ log 1.25)	log 0.9326~ 1.0522	log 0.8686~ 1.0210	-	-
* (AUC, C _{max} , t _{1/2} ; 평균값 ± 표준편차, T _{max} ; 중앙값(범위), n = 37) AUC: 투약시간당부 최종혈중농도 정량시간 1까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 말단 소실 반감기 * 비교평가항목치를 로그변환한 평균치 치의 90%신뢰구간				

주1. 이 약은 (한국파비스제약) 암로베핀정(암로디핀베실산염)과 동일한 원료를 사용하여 동일한 제조방법으로 된 공정을 (한국파비스제약)에 위탁 제조하였음.

11. 기타
1) 발암성
암로디핀 0.5, 1.25, 2.5 mg/kg/day를 2년동안 먹이 속에 투여한 랫드 및 마우스에서 발암성의 증가는 나타나지 않았다. 또한, 이 시험에서 투여된 최고용량은 마우스의 최대 내약성용량 (Maximum Tolerating Dose)에 근접하였다(마우스에서는 mg/m²기준으로 임상 최대 권장용량인 10 mg에 근접한 용량, 랫드에서는 임상 최대 권장용량의 2배).
2) 돌연변이성
돌연변이 시험에서 이 약은 유전자 혹은 크로모소 수치에 영향을 미치지 않았다.
3) 수태능 이상
10 mg/kg/day용량까지의 암로디핀 (mg/m²기준으로 임상 최대 권장 용량인 10 mg의 8배*)으로 처치한 랫드 (교미 전에 수컷은 64일 동안, 암컷은 14일 동안) 처치에서 수태능에 대한 영향은 나타나지 않았다.
* 환자의 체중 50 kg 기준
4) 건강한 성인에서 암로디핀정 10 mg과 암로디핀구강붕해정 10 mg을 공복상태에서 난회투여시 AUC 및 C_{max}가 생물학적으로 동등하였다.

[포장단위] 30 정/병, 500 정/병
[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관
[사용기간] 제조일로부터 36개월

※ 만약 구입 당시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정 거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
※ 본 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지 www.yuans.co.kr에서 확인할 수 있습니다.
※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보 시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr/>)을 참조하시기 바랍니다.
※ 본 약제 투약 또는 복용 후 부작용(이상사례)이 발생한 경우 한국 의약품안전관리원(1644-6223)으로 문의 및 보고하여 주시고, 동일 기관에 의약품 부작용 피해구제 신청을 하실 수 있습니다.
※ 의약품 부작용 피해구제대상 : 14-3330
※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.
※ 첨부문서 작성일자: 2021년 6월 24일
※ 소비자상담실 : 031-891-2243

YU&생명과학

[제조외지] (주)유엔생명과학 경기도 안산시 단원구 별양로 627
Tel:031-365-3859 / Fax: 031-365-3869
[제조지] (주)한국파비스제약 경기도 안산시 단원구 산단로 83번길 127